

# Дерматовенерология

№1

Дайте определение межклеточного отека:

- 1  спонгиоз
- 2  акантоз
- 3  паракератоз
- 4  гипергранулез

№2

Укажите бесполостной экссудативный элемент:

- 1  пузырь
- 2  волдырь
- 3  пустула
- 4  узел

№3

К тяжелой форме псориаза относится:

- 1  эритродермия
- 2  псориаз ногтей
- 3  себорейный
- 4  каплевидный

№4

Для какой стадии псориаза характерна псориатическая триада:

- 1  прогрессирующей
- 2  регрессирующей
- 3  стационарной
- 4  хронической

№5

Для красного плоского лишая характерно:

- 1  поражение пушковых волос
- 2  появление папул с «пупковидным» вдавлением в центре
- 3  эритема на лице по типу «бабочки»
- 4  положительная йодная проба Бальцера

№6

Симптом Арди-Горчакова характерен для:

- 1  псориаза
- 2  пузырчатки
- 3  буллезного пемфигоида
- 4  чесотки

№7

Волдырь образуется при:

- 1  крапивнице
- 2  акантолитической пузырчатке
- 3  красном плоском лишае
- 4  эритезме

№8

Клиническое проявление разноцветного лишая:

- 1  пятна цвета «кофе с молоком»
- 2  гнойные корки
- 3  возникновение пустул

4  выпадение волос

№9

Для очагов при склеродермии характерно:

- 1  положительный симптом Никольского
- 2  эритема, уплотнение, атрофия
- 3  на поверхности обнаруживают *Treponema pallidum*
- 4  повышенная чувствительность к йоду

№10

Симптом «канцелярской кнопки» наблюдается при:

- 1  красной волчанке
- 2  псориазе
- 3  лепре
- 4  пятнистом лишае

№11

Регрессирующая стадия псориаза характеризуется:

- 1  появлением псевдоатрофического ободка Воронова
- 2  положительным феноменом псориазической триады
- 3  положительной изоморфной реакцией Кебнера
- 4  появлением милиарных папул

№12

Феномен «точечного кровотечения» при псориазе обусловлен:

- 1  папилломатозом
- 2  акантозом
- 3  гипергранулезом
- 4  гиперкератозом

№13

Чесотка может осложниться:

- 1  пиодермией
- 2  образованием свищей
- 3  очаговой алопецией
- 4  поражением внутренних органов

№14

Для эритразмы характерно:

- 1  реакция обострения Герксгеймера-Яриша-Лукашевича
- 2  очаги кирпично-коричневого цвета в крупных складках кожи
- 3  наличие буллезных высыпаний
- 4  симптом Пинкуса

№15

У больных отрубевидным лишаем наблюдается следующее:

- 1  пятна цвета «кофе с молоком»
- 2  локализация на ногтевых пластинках
- 3  образование скутул
- 4  локализация на ладонях и подошвах

№16

Выберите «атипичную» форму твердого шанкра:

- 1  шанкр-панариций
- 2  корковый шанкр
- 3  эрозивный шанкр
- 4  ожоговый шанкр

№17

С каким заболеванием дифференцируют твердый шанкр:

- 1  шанкриформной пиодермией
- 2  фавусом
- 3  вульгарным сикозом
- 4  эритразмой

№18

Реакция обострения Герксгеймера-Яриша-Лукашевича характерна для:

- 1  псориаза
- 2  красного плоского лишая
- 3  чесотки
- 4  вторичного периода сифилиса

№19

Симптом Пинкуса характерен для:

- 1  чесотки
- 2  красного плоского лишая
- 3  псориаза
- 4  вторичного периода сифилиса

№20

Симптом раннего врожденного сифилиса:

- 1  диффузная инфильтрация Гохзингера
- 2  наличие бугорков
- 3  наличие пятнистых элементов
- 4  диффузная алопеция

№21

Достоверные признаки позднего врожденного сифилиса:

- 1  лабиринтная глухота
- 2  радиарные рубцы Робинсона-Фурнье
- 3  псевдопаралич Парро
- 4  сифилитический ринит

№22

Гонорейный уретрит может осложниться:

- 1  простатитом
- 2  образованием скутул
- 3  фолликулярным гиперкератозом
- 4  онихогрифозом

№23

Какое заболевание вызывает *Neisseria gonorrhoeae*:

- 1  трихомоноз
- 2  гонорею
- 3  сифилис
- 4  микроспорию

№24

Укажите особенность возбудителя гонореи:

- 1  является диплококком
- 2  имеет спиралевидную форму
- 3  имеет грушевидную форму
- 4  представлен двумя клеточными формами

№25

Самая частая форма трихомониаза у женщин:

- 1  уретрит

- 2  вагинит
- 3  эндоцервицит
- 4  бартолинит

#### №26

Для изоморфной реакции Кебнера характерно:

- 1  появление новых высыпных элементов на месте травматизации кожи
- 2  появление акантолитических клеток Тцанка
- 3  появление рубцов на месте высыпных элементов
- 4  исход высыпных элементов в атрофию

#### №27

Для сифилитической розеолы характерно:

- 1  наличие муковидного шелушения на поверхности
- 2  положительная псориатическая триада
- 3  болезненность при поскабливании
- 4  исчезает при надавливании

#### №28

Розеолы при сифилисе дифференцируют с:

- 1  розовым лишаем Жибера
- 2  акантолитической пузырьчаткой
- 3  герпетиформным дерматитом Дюринга
- 4  шанкриформной пиодермией

#### №29

Симптом Пинкуса характерен для:

- 1  чесотки
- 2  красного плоского лишая
- 3  псориаза
- 4  вторичного периода сифилиса

#### №30

Патогномоничный симптом раннего врожденного сифилиса:

- 1  диффузная инфильтрация Гохзингера
- 2  наличие бугорков на коже туловища
- 3  пятнистые элементы на коже туловища
- 4  диффузная алопеция волосистой части головы

#### №31

Тяжелые формы псориаза:

- 1  эритродермия
- 2  экссудативный
- 3  себорейный
- 4  артропатический

#### №32

Пузырек состоит из:

- 1  дна
- 2  полости
- 3  ножки
- 4  покрышки

#### №33

Полостные морфологические элементы:

- 1  пятно
- 2  узел
- 3  пузырек

4  пузырь

#### №34

Вторичные морфологические элементы:

- 1  трещина
- 2  папула
- 3  пузырек
- 4  язва

#### №35

Бесполостные морфологические элементы:

- 1  бугорок
- 2  пузырь
- 3  пузырек
- 4  пятно

#### №36

Папула представляет собой:

- 1  первичный бесполостный эпидермально-дермальный элемент
- 2  первичный морфологический элемент, располагающийся в гиподерме
- 3  первичный морфологический элемент, выступающий над уровнем кожи
- 4  первичный морфологический элемент, всегда разрешающийся с образованием рубца

#### №37

Прогрессирующая стадия псориаза характеризуется:

- 1  появлением милиарных и лентикулярных папул
- 2  отсутствием венчика периферического роста
- 3  положительной изоморфной реакцией Кебнера
- 4  отрицательной псориатической триадой

#### №38

Псориаз ладоней и подошв дифференцируют с:

- 1  вторичным сифилисом
- 2  чесоткой
- 3  роговой экземой ладоней и подошв
- 4  дисгидротической экземой

#### №39

Симптом «псориатической триады» включает:

- 1  феномен «стеаринового пятна»
- 2  феномен «терминальной плёнки»
- 3  феномен «точечного кровотечения»
- 4  феномен «стружки»

#### №40

Пузырную форму красного плоского лишая дифференцируют с:

- 1  акантолитической пузырьчаткой
- 2  микроспорией
- 3  герпетиформным дерматитом Дюринга
- 4  отрубевидным лишаем

#### №41

В симптомокомплекс Лассюэра-Литтла входят:

- 1  мелкоочаговая алопеция подмышечных впадин и лобка
- 2  фолликулярный кератоз на разгибательных поверхностях конечностей
- 3  симптом Пинкуса
- 4  рубцовая алопеция волосистой части головы

#### №42

Для фурункула характерно:

- 1  является глубоким стафилококковым поражением
- 2  является глубоким стрептококковым поражением
- 3  возможно рецидивирующее течение
- 4  в воспалительный процесс вовлекается волосяной фолликул

№43

К глубоким стафилококковым поражениям кожи относятся:

- 1  фурункул
- 2  карбункул
- 3  фликтена
- 4  щелевидное импетиго

№44

Чесотка может осложняться:

- 1  склерозированием очагов
- 2  пиодермией
- 3  экзематизацией
- 4  поражением внутренних органов

№45

Для чесотки характерно:

- 1  отсутствие субъективных ощущений
- 2  зуд кожи в ночное время
- 3  локализация высыпаний по ходу нервных окончаний
- 4  наличие парных папул на коже туловища

№46

Для микробной экземы характерно:

- 1  асимметричность поражения
- 2  наличие пустул в экзематозном очаге
- 3  наличие бугорков в экзематозном очаге
- 4  положительная проба Бальцера

№47

Для атопического дерматита характерно:

- 1  белый дермографизм
- 2  начало в детском возрасте
- 3  зуд
- 4  наличие узлов в подкожно-жировой клетчатке

№48

С какими заболеваниями часто сочетается атопический дерматит:

- 1  с поллинозом
- 2  с вазомоторным ринитом
- 3  с бронхиальной астмой
- 4  со склеродермией

№49

Назовите симптомы острой крапивницы:

- 1  излюбленная локализация на коже шеи
- 2  острое начало
- 3  обильные уртикарные высыпания на туловище и конечностях
- 4  единичные папулы в области лица и шеи

№50

Для эритезмы характерно:

- 1  локализация в крупных складках

- 2  локализация на коже лица
- 3  очаги кирпично-коричневого цвета
- 4  наличие буллезных высыпаний

#### №51

К глубоким микозам относится:

- 1  рубромикоз
- 2  глубокий бластомикоз
- 3  зоонозная микроспория
- 4  хромомикоз

#### №52

Укажите симптомы дискоидной красной волчанки:

- 1  положительная йодная проба Бальцера
- 2  положительная йодная проба Ядассона
- 3  эритема на коже лица, напоминающая «бабочку»
- 4  болезненность при поскабливании высыпных элементов

#### №53

Стадии очаговой склеродермии кожи:

- 1  эритема и отек
- 2  склероз (уплотнение)
- 3  атрофия
- 4  гиперкератоз

#### №54

Клинические признаки первичного сифилиса:

- 1  твердый шанкр
- 2  регионарный лимфаденит
- 3  гуммы
- 4  алопеция

#### №55

Разновидности атипичных твердых шанкров:

- 1  шанкр-панариций
- 2  гуммозный шанкр
- 3  индуративный отек
- 4  шанкр-амигдалит

#### №56

Осложнения твердого шанкра:

- 1  баланопостит
- 2  парафимоз
- 3  индуративный отек
- 4  гангренизация

#### №57

Твердый шанкр сопровождается:

- 1  регионарным лимфаденитом
- 2  поражением волос и ногтевых пластинок
- 3  появлением бугорков на коже туловища
- 4  лимфангиитом

#### №58

Разновидности сифилитической лейкодермы:

- 1  сливная
- 2  сетчатая
- 3  мраморная

4  кружевная

№59

Клинические проявления вторичного свежего сифилиса:

- 1  остатки твердого шанкра
- 2  розеолы
- 3  положительные серологические реакции
- 4  гуммы

№60

Розеолы при сифилисе дифференцируют с:

- 1  розовым лишаем Жибера
- 2  акантолитической пузырчаткой
- 3  герпетиформным дерматитом Дюринга
- 4  отрубевидным лишаем