

Госп. хирургия: «Осложнения грыж живота»

1

Выберите правильное определение понятия грыжи.

- Перемещение органов брюшной полости через естественные или искусственные отверстия в соседние полости или под кожу.
- Перемещение органов брюшной полости, через естественные или искусственные отверстия под кожу.
- Перемещение органов брюшной полости, покрытых брюшиной, через естественные или искусственные отверстия в соседние полости или под кожу

2

Укажите, где расположено внутреннее отверстие (глубокое кольцо) пахового канала.

- Fossa supravesicalis.
- Fossa ingvinalis medialis
- Fossa ingvinalis lateralis

3

Укажите, через какую ямку передней брюшной стенки выходит косая паховая грыжа?

- Fossa supravesicalis.
- Fossa ingvinalis medialis.
- Fossa ingvinalis lateralis

4

Укажите, через какую ямку передней брюшной стенки выходит прямая паховая грыжа.

- Fossa supravesicalis.
- Fossae ingvinalis medialis.
- Fossa ingvinalis lateralis

5

При сращении сальника с грыжевым мешком возникает симптом «натянутой струны». Укажите правильную его интерпретацию.

- Усиление боли в паховой области при сгибании в тазобедренном суставе.
- Усиление болей в паховой области
- Уменьшение болей в паху в полусогнутом положении тела и усиление при полном выпрямлении туловища

6

Грыжи какой локализации занимают первое место?

- Паховые.
- Грыжи белой линии живота.
- Пупочные.
- Бедренные

7

Укажите правильную характеристику грыжевого мешка.

- Устье, шейка, тело
- Шейка, дно.
- Тело, устье, дно.
- Дно, тело, шейка, устье

8

Допускается ли ручное вправление содержимого при ущемленных грыжах?

- Нет
- Да, всегда.
- Да, но при абсолютных противопоказаниях к операции (свежий инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения, острая дыхательная недостаточность).
- Да, но при абсолютных противопоказаниях к операции (свежий инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения, острая дыхательная недостаточность) с учетом сроков после ущемления

9

Какие паховые грыжи могут носить врожденный и приобретенный характер?

- Прямые.
- Косые.
- И прямые, и косые.
- Скользящие

10

Укажите форму паховой грыжи, если грыжевой мешок определяется в паховом канале.

- Начальная.
- Канальная.
- Канатиковая.
- Мошоночная

11

Укажите форму паховой грыжи, если дно грыжевого мешка доходит до наружного отверстия пахового канала.

- Начальная.
- Канальная.
- Канатиковая.
- Мошоночная

12

Укажите форму паховой грыжи, если грыжевой мешок спускается по ходу семенного канатика.

- Начальная.
- Канальная.
- Канатиковая.

Мошоночная

13

При скользящих грыжах грыжевой мешок можно ушивать только:

- Извне
- Изнутри
- Извне и изнутри
- Способ ушивания значения не имеет

14

С какими заболеваниями проводится дифференциальный диагноз при грыжах белой линии живота?

- Предбрюшинная липома.
- Доброкачественные опухоли брюшной полости
- Метастазы опухоли в сальник.
- Все ответы верны

15

Перечислите составные элементы истинной грыжи. 1) Грыжевые ворота, грыжевой мешок, органы брюшной полости. 2) Грыжевой мешок. 3) Органы брюшной полости. 4) Кожа. 5) Подкожная клетчатка. 6) Грыжевые оболочки. Выберите правильную комбинацию ответов:

- 1, 2, 3, 5
- 2, 4, 5, 6
- 3, 4, 6
- 1, 3, 5, 6
- Все ответы верны

16

Укажите возрастные пики заболеваемости наружными грыжами по годам.

- 20—30 лет.
- 30—40 лет
- 40—50 лет.
- 50—60 лет
- 60—70 лет и старше

17

Выберите причины, которые способствуют образованию наружных грыж.

- Повышение внутрибрюшного давления (кашель, запоры, подъем тяжестей).
- Врожденная недостаточность соединительной ткани.
- Похудание.
- Ожирение.

Все ответы верны

18

Назовите слабые места передней брюшной стенки.

- Зона пахового канала.
- Овальная ямка на бедре.
- Пупок.
- Подпупочный отдел апоневроза белой линии живота.
- Все ответы верны

19

Какими элементами брюшной стенки может быть окружен грыжевой мешок?

- Предбрюшинной клетчаткой.
- Истонченной поперечной фасцией.
- Истонченной поверхностной фасцией.
- Волокнами мышц.
- Все ответы верны

20

Назовите грыжи, при которых грыжевого мешка может не быть?

- Прямые паховые.
- Бедренные.
- Скользящие.
- Ложные травматические.
- При всех видах грыж

21

Укажите жалобы больных, страдающих грыжами.

- Боль в области грыжевого выпячивания.
- Боль в пояснице.
- Диспептические явления (тошнота, отрыжка, рвота, запор, метеоризм).
- Нарушение мочеиспускания.
- Все ответы верны

22

Какие методы обследования позволяют подтвердить наличие или отсутствие грыжи?

- Осмотр, пальпация, аускультация.
- Рентгеноскопия и рентгенография брюшной полости.
- Контрастирование кишечника.
- Контрастирование мочевого пузыря.

Все ответы верны

23

Какое ущемление при грыжах сопровождается неполным сдавлением кишки?

- Эластическое.
- Каловое.
- Рихтеровское.
- Ретроградное.
- Все ответы верны

24

Каковы признаки флегмоны грыжевого мешка? 1) Боль в области грыжи. 2) Отек кожи над грыжей. 3) Цианоз кожи над грыжей. 4) Повышение температуры над грыжей. 5) Регионарный лимфаденит. 6) Высокая температура тела. 7) Тахикардия. 8) Брадикардия. 9) Отсутствие болезненности при пальпации грыжи. Выберите правильную комбинацию ответов:

- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- 1, 2, 4, 5, 6
- 3, 4, 6
- 1, 3, 5, 6
- 1, 4, 6

25

Выберите симптомы при осложнении грыжи каловым застоем. 1) Увеличение грыжевого выпячивания. 2) Гиперемия кожи над грыжевым выпячиванием. 3) Резкая болезненность при пальпации грыжи. 4) Пальпация грыжи мало болезненна. 5) В кишечных петлях определяются плотные комки каловых масс. 6) Общее состояние больного страдает незначительно. Выберите правильную комбинацию ответов:

- 1, 2, 3, 5
- 1, 4, 6
- 3, 5, 6
- 1, 3, 5, 6
- Все ответы верны, кроме 4

26

Укажите этап операции, который отсутствует при плановом грыжесечении.

- Выделение грыжевого мешка
- Открытие грыжевого мешка и вправление его содержимого в брюшную полость
- Открытие грыжевого мешка, содержимое которого удерживается, после чего рассекаются грыжевые ворота, оценивается жизнеспособность органов и только после этого они вправляются
- Шейка грыжевого мешка прошивается и перевязывается, а остатки грыжевого мешка иссекаются.
- Выполняется пластика передней брюшной стенки

27

Какова последовательность действий хирурга при флегмоне грыжевого мешка?

- Первым этапом вскрывают грыжевой мешок, а затем выполняют резекцию кишки через лапаротомный доступ.
- Первым этапом вскрывают грыжевой мешок, а затем выполняют резекцию кишки после рассечения ущемляющего кольца.
- Первым этапом выполняют лапаротомию, вторым - резекцию кишки, наложения анастомоза, ушивания брюшной полости, а затем вскрывают грыжевой мешок и удаляют некротизированную кишку.
- Последовательность действий не имеет существенного значения.
- В каждом конкретном случае последовательность действий выбирается индивидуально

28

Какие анатомические элементы участвуют в формировании пахового канала?1) Подвздошно-ребешковая связка.2) Поверхностная фасция бедра.3) Нижний край внутренней косой и поперечной мышцы живота.4) Аponeвроз наружной косой мышцы живота.5) Паховая связка.6) Поперечная фасция.

- 1, 2, 3, 4
- 1, 4, 5, 6
- 3, 4, 5, 6
- 1, 3, 5, 6
- Все ответы верны, за исключением 2

29

Укажите длину пахового канала в норме (см)

- До 1
- 2 - 3.
- 4 -5.
- 6 - 7.
- 8 -9

30

Если на дне грыжевого мешка расположено яичко, какая это грыжа?

- Прямая паховая.
- Косая приобретенная паховая грыжа.
- Косая врожденная паховая грыжа.
- Скользящая косая паховая грыжа.
- Скользящая прямая паховая грыжа

31

При какой грыже влагалищный отросток брюшины остается незаращенным?

- При прямых.
- При врожденных косых.
- При приобретенных косых.
- При скользящих.
- При всех указанных видах грыж

32

Что может быть содержимым паховой грыжи?

- Слепая кишка, червеобразный отросток.
- Ободочная кишка.
- Желудок.
- Поджелудочная железа
- Любой орган брюшной полости, кроме печени и поджелудочной железы

33

Назовите широко применяемые в клинической практике операции, при которых выполняется пластика передней стенки пахового канала.1) Операция Жирара.2) Операция Жирара—Спасокуоцкого швами Кимбаровкого.3) Операция Бассини.4) Операция Постемского.5) Операция Кукуджанова.6) Операция Мартынова.Выберите правильную комбинацию ответов:

- 1, 2, 5
- 1, 2, 6
- 2, 6
- 3, 4
- Все ответы верны

34

Назовите операции, при которых выполняется пластика задней стенки пахового канала.1) Операция Жирара.2) Операция Жирара—Спасокуоцкого швами Кимбаровкого.3) Операция Бассини.4) Операция Постемского.5) Операция Кукуджанова.6) Операция Мартынова.Выберите правильную комбинацию ответов:

- 1, 2, 5
- 1, 2, 6
- 2, 6
- 3, 4
- Все ответы верны

35

При каком способе пластика производится путем подшивания апоневроза наружной косой мышцы живота к пупартовой связке, а затем следует создание дубликатуры?

- При операции Жирара.
- При операции Жирара—Спасокуоцкого швами Кимбаровкого.
- При операции Бассини.
- При операции Постемского.
- При операции Мартынова

36

При каком способе пластики задней стенки пахового канала семенной канатик располагается в подкожной клетчатке?

- При операции Жирара.
- При операции Жирара—Спасокуоцкого швами Кимбаровкого.

- При операции Бассини.
- При операции Постемского.
- При операции Мартынова

37

При каком способе операции после пластики поверхностное кольцо пахового канала находится напротив глубокого кольца?

- При операции Жирара.
- При операции Жирара—Спасокукоцкого швами Кимбаровского.
- При операции Бассини.
- При операции Постемского.
- При операции Мартынова

38

При каких грыжах особенность техники операции состоит в том, что грыжевой мешок вначале выделяют у шейки, перевязывают его и рассекают вдоль, выворачивают и сшивают позади семенного канатика и яичка?

- При приобретенных косых паховых грыжах
- При прямых паховых грыжах.
- При врожденных косых паховых грыжах.
- При прямых скользящих грыжах.
- При косых скользящих грыжах

39

При скользящей правосторонней паховой грыже латеральной стенкой грыжевого мешка чаще всего является:

- Слепая кишка
- Сигмовидная кишка
- Мочевой пузырь
- Придатки матки
- Гонимая кишка

40

При скользящей паховой грыже медиальной стенкой грыжевого мешка чаще всего является:

- Слепая кишка
- Сигмовидная кишка
- Мочевой пузырь
- Придатки матки
- Гонимая кишка

41

Какова летальность в процентном отношении при операции по поводу неосложненной грыжи?

- Около 0%

- 1%.
- 2%.
- 3%.
- 4%

42

Укажите летальность при операциях по поводу осложненных грыж (%).

- От 0 до 7
- 8—15.
- 16—23.
- 24—28.
- 29 – 31

43

Какими анатомическими образованиями ограничен скарповский (бедренный) треугольник?1) Пупартовой связкой.2) Прямой мышцей живота.3) Наружной косой мышцей живота.4) Длинной приводящей мышцей.5) Портняжной мышцей. Выберите правильную комбинацию ответов:

- 1, 2, 5
- 1, 3, 5
- 1, 4, 5
- 2, 3, 4
- 3, 4, 5

44

При образовании бедренной грыжи, какие элементы образуют бедренный канал?1) Паховая связка.2) Лонная кость.3) Апоневроз наружной косой мышцы живота.4) Бедренная вена.5) Большая подкожная вена.6) Лакунарная (жимбернатова) связка.7) Овальная ямка. Выберите правильную комбинацию ответов:

- 1, 2, 6, 7
- 1, 2, 4, 6
- 2, 5, 6, 7
- 3, 4, 5, 6
- Все ответы верны

45

Какими элементами покрыт грыжевой мешок при бедренных грыжах?1) Предбрюшинной клетчаткой.2) Поперечной фасцией.3) Жировой тканью.4) Решетчатой фасцией.5) Подкожной клетчаткой.6) Кожей. Выберите правильную комбинацию ответов:

- 1, 2, 5, 6
- 1, 2, 3, 6
- 2, 4, 6
- 3, 4, 6

Все ответы верны

46

Какие органы чаще находятся в грыжевом мешке при бедренных грыжах? 1) Большой сальник. 2) Петли тонкой кишки. 3) Слепая кишка. 4) Ободочная кишка. 5) Желудок. 6) Желчный пузырь. 7) Мочевой пузырь. 8) Матка и ее придатки. Выберите правильную комбинацию ответов:

1, 2, 5

1, 2, 6

1, 2

3, 4

Все ответы верны

47

С какими заболеваниями следует проводить дифференциальную диагностику у больных с бедренными грыжами?

Лимфаденит (банальный, туберкулезный).

Аневризматическое расширение большой подкожной вены.

Опухоли лимфатических узлов.

Натечные абсцессы.

Все ответы верны

48

Укажите, какие осложнения возможны при операции по поводу бедренной грыжи? 1) Ранение бедренной вены. 2) Ранение бедренной артерии. 3) Ранение запирающей артерии. 4) Ранение мочевого пузыря. 5) Ранение бедренного нерва. 6) Ранение седалищного нерва. Выберите правильную комбинацию ответов:

1, 2, 5

1, 2, 3, 4

2, 6

3, 4, 5, 6

Все ответы верны

49

Какие методы дополнительного обследования обязательны при грыжах белой линии живота?

УЗИ брюшной полости.

Фиброгастроскопия.

Фиброколоноскопия.

Рентгеноскопия желудка.

50

Укажите места, где образование редких грыж невозможно.

Спигелевая линия.

Поясничная область.

Запирательный канал.

- Ягодичная область, промежность.
- Правое поддиафрагмальное пространство

51

Передней стенкой пахового канала являются:

- Наружная косая мышца живота
- Апоневроз наружной косой мышцы.
- Внутренняя косая мышца.
- Поперечная мышца.
- Лакунарная связка

52

Задней стенкой пахового канала являются:

- Наружная косая мышца живота
- Апоневроз наружной косой мышцы.
- Внутренняя косая мышца.
- Поперечная мышца.
- Лакунарная связка

53

Бедренное кольцо снаружи ограничено:

- Лакунарной связкой.
- Куперовской связкой.
- Лимфатическим узлом Розенмюллера-Пирогова.
- Паховой связкой.
- Влагилицем бедренной вены

54

Медиальнее глубокого пахового кольца располагаются:

- Нижние надчревные артерии и вены.
- Запирательная артерия.
- Бедренный нерв
- Наружная подвздошная артерия.
- Бедренная артерия

55

Каким может быть ущемление при грыжах по их видам?

- Эластическое.
- Ретроградное.

Каловое.

Рихтеровское.

56

Какими могут быть ущемления по механизму?

Эластическое.

Ретроградное.

Каловое.

Рихтеровское.

57

Какие анатомические элементы проходят в паховом канале?

Семявыносящий проток.

Кровеносные и лимфатические сосуды.

Остаток влагалищного отростка брюшины.

Общая бедренная артерия и вена.

58

Какие методы пластики брюшной стенки должны использоваться при скользящих грыжах?

Только методы пластики передней стенки пахового канала.

Только методы пластики задней стенки пахового канала.

Методы пластики передней и задней стенки пахового канала.

Метод пластики существенного значения не имеет.

59

Укажите элементы, заполняющие овальную ямку.

Жировая клетчатка.

Лимфатический узел

Большая подкожная вена.

Бедренная артерия и вена.