

Инфекционные осложнения ран

1

Вторичной гнойной раной называется рана, образовавшаяся:

- ☐ после некротомии
- ☐ вследствие авитаминоза
- ☐ после вскрытия гнойного очага
- ☐ вследствие нагноения травматической раны
- ☐ после некрэктомии

2

Какое значение имеет возникновение вторичного инфицирования раны:

- ☐ сокращается срок до начала гнойного осложнения
- ☐ аггавируется тяжесть инфекционного осложнения
- ☐ удлиняются сроки фазы реорганизации рубца и эпителизации
- ☐ резко возрастает вероятность гнойного осложнения раневого процесса
- ☐ удлиняются сроки фазы регенерации

3

Для местных признаков воспаления характерно все, кроме:

- ☐ отека
- ☐ цианоза
- ☐ повышения местной температуры
- ☐ нарушения функции
- ☐ болей

4

Рост этиологической роли грамм-отрицательных бактерий в развитии гнойно-септических осложнений ран является преимущественно следствием:

- ☐ внутригоспитальной инфекции
- ☐ инфекции, передающейся гематогенным путем
- ☐ инфекции, передающейся лимфогенным путем
- ☐ иммунодефицита
- ☐ анемии

5

Принцип активного хирургического лечения гнойных ран обеспечивает:

- ☐ сокращение фазы регенерации
- ☐ перевод гнойной раны в заживление по типу первичного натяжения
- ☐ нормализацию состояния больного
- ☐ бактериостатический эффект
- ☐ бактерицидное действие

6

Показанием к вторичной хирургической обработке раны является:

- ☐ наличие гнойной раны
- ☐ проникающее ранение
- ☐ непроникающее ранение с бактериальным загрязнением
- ☐ возникновение осложнения раневого процесса
- ☐ все перечисленное

7

Вторичная хирургическая обработка проводится:

- ☐ на асептической хирургической ране
- ☐ на гнойной ране по вторичным показаниям
- ☐ на гранулирующей ране
- ☐ на эпителизирующейся ране
- ☐ на свежей травматической ране

8

Сроком наложения раннего вторичного шва является:

- ☐ 1-2 суток
- ☐ 3-4 суток
- ☐ до 5-7 дней
- ☐ 7-21 сутки
- ☐ 3-4 недели

9

При отсутствии возможности сопоставления краев раны в фазе регенерации выполняется:

- ☐ первично-отсроченный шов
- ☐ первичный шов
- ☐ ранний вторичный шов
- ☐ аутодермопластика
- ☐ все перечисленное верно

10

При первичном микробном загрязнении бактерии в рану попадают:

- ☐ в момент ранения
- ☐ в первые минуты после ранения
- ☐ до наложения асептической повязки
- ☐ в течение всего времени нахождения раненого на поле боя
- ☐ в период до первичной хирургической обработки раны

11

Какое значение имеет вторичное бактериальное загрязнение ран?

- ☐ сокращается срок до начала гнойного осложнения
- ☐ резко возрастает вероятность гнойного осложнения раневого процесса
- ☐ агравирется тяжесть инфекционного осложнения
- ☐ возникает необходимость проведения дополнительных профилактических и лечебных мероприятий
- ☐ удлиняются сроки лечения

12

Основным элементом предупреждения вторичного бактериального загрязнения ран является:

- ☐ применение антибиотиков в ранние сроки
- ☐ своевременная иммобилизация
- ☐ своевременное и тщательное наложение медицинской повязки
- ☐ выполнение ПХО в ранние сроки
- ☐ своевременная транспортировка раненого в стационар

13

Что препятствует переходу микробного загрязнения в инфекцию ран?

- ☐ своевременное наложение повязки
- ☐ раннее и систематическое применение антибиотиков
- ☐ раннее применение антисептиков
- ☐ бережная и своевременная эвакуация
- ☐ всё перечисленное

14

Что служит надежным препятствием развития инфекции наряду с полноценной первичной хирургической обработкой раны?

- ☐ применение антибиотиков широкого спектра действия
- ☐ своевременная иммобилизация
- ☐ своевременное наложение асептической повязки
- ☐ применение антисептиков
- ☐ бережная и своевременная эвакуация

15

Что такое флегмона?

- ☐ ограниченная полость по ходу раневого канала или рядом с ним, отделение гноя из которой невозможно или затруднено
- ☐ воспаление тканей без четких контуров в результате диффузного гнойно-инфильтративного распространения
- ☐ пассивное распространение гноя за пределы раневого канала по ходу прослоек рыхлой клетчатки, сообщающиеся с гнойной раной
- ☐ узкий канал, через который очаг нагноения сообщается с внешней средой или полыми органами
- ☐ воспалительный процесс, локализующийся преимущественно в области раны, вызывая при этом более или менее выраженную реакцию всего организма

16

Характерным для начала сепсиса является:

- ☐ высокие подъемы температуры с гектическими размахами
- ☐ высокая температура утром и вечером
- ☐ отсутствие четкой грани перехода от токсико-резорбтивной лихорадки к сепсису
- ☐ начало высевания патогенной микрофлоры из крови
- ☐ прогрессирующее снижение Hb, сдвиг формулы влево

17

Что всегда развивается при длительно существующей гнойно-резорбтивной лихорадке или сепсиса?

- ☐ абсцедирующие пневмонии
- ☐ раневое истощение
- ☐ множественные гнойничковые поражения кожи
- ☐ септицемия
- ☐ септикопиемия

18

Главным условием успеха в лечении гнойных осложнений ран является:

- ☐ антибиотикотерапия
- ☐ полноценная хирургическая обработка раны
- ☐ сульфаниламидотерапия
- ☐ переливания крови, белковых препаратов и глюкозосодержащих растворов
- ☐ физиотерапия

19

Что является показанием к ампутации конечности при сепсисе?

- ☐ аггравация состояния больного
- ☐ неэффективность комплексной терапии
- ☐ агрессивное течение местного гнойного процесса
- ☐ отсутствие положительной динамики местного гнойного процесса
- ☐ всё перечисленное

20

Какой из методов применения антибиотиков является наиболее эффективным в настоящее время?

- ☐ местные аппликации
- ☐ внутримышечное введение антибиотика резерва
- ☐ внутривенное введение
- ☐ внутриартериальная регионарная перфузия
- ☐ внутрикостное введение

21

Что из перечисленного относится к местным факторам, способствующим возникновению анаэробной инфекции?

- ☐ обширность повреждения тканей
- ☐ разможнения тканей
- ☐ локализация ранений
- ☐ нарушения кровоснабжения раненой конечности
- ☐ всё правильно

22

Исключительно важными условиями профилактики анаэробной инфекции являются:

- ☐ своевременный розыск пострадавшего
- ☐ раннее закрытие ран первичной защитной повязкой
- ☐ своевременное и полноценное оказание первой помощи
- ☐ бережный вынос раненого и щадящая эвакуация
- ☐ всё перечисленные

23

Какой из перечисленных общих симптомов является самым ранним проявлением анаэробной инфекции?

- ☐ появление лихорадки.
- ☐ желтушная окраска кожи и склер.
- ☐ «ножницы» между частотой пульса (тахикардия) и температурой.
- ☐ состояние тяжелой депрессии.
- ☐ частое поверхностное дыхание..

24

Какой из перечисленных симптомов является начальным проявлением анаэробной инфекции?

- ☐ распирающие боли в ране.
- ☐ пятна на коже бурой, желтой, синей окраски.
- ☐ проявление на коже пузырей с геморрагическим содержимым
- ☐ выпирающие из раны мышцы серого цвета (цвета «вареного мяса»).
- ☐ некроз всех тканей.

25

У больного с анаэробной инфекцией - состояние крайне тяжелое, нога резко отекает, чувствительность и движения в пальцах стопы отсутствуют, нарастает интоксикация. Укажите мероприятие по жизненным показаниям.

- ☐ дезинтоксикационная терапия.
- ☐ гипербарическая оксигенация.
- ☐ лампасные разрезы.
- ☐ лампасные разрезы с иссечением мертвых тканей.
- ☐ ампутация конечности.

26

Какова роль антибиотиков при лечении огнестрельных ран?

- ☐ стерилизуют рану.

- ☐ временно подавляют развитие инфекционных осложнений раны.
- ☐ никакой роли не играют, т. к. микробная флора не чувствительна к ним.
- ☐ применение их вредно из-за аллергических реакций.
- ☐ ухудшают течение раневого процесса.

27

Что является причиной формирования гнойных затеков? 1) затруднение оттока отделяемого из раны 2) длительная задержка отделяемого в ране 3) обтурация свищевого хода 4) все правильно. Выберите:

- ☐ 1, 2
- ☐ 2, 3
- ☐ 3, 4
- ☐ 1, 3

28

От чего зависит степень реакции организма на гнойный процесс в ране? 1) состава микробных ассоциаций 2) характера ранения и особенностей раны 3) качества хирургической обработки 4) всего перечисленного. Выберите:

- ☐ 1, 2
- ☐ 2, 3
- ☐ 3, 4
- ☐ 1, 3

29

Чем определяется токсико-резорбтивная лихорадка?

- ☐ всасыванием из раны продуктов гнойно-гнилостного распада тканей, токсинов и самих микроорганизмов
- ☐ наличием гнойного очага
- ☐ высотой реакции организма на резорбцию из раны продуктов гнойно-гнилостного распада тканей, токсинов и самих микроорганизмов
- ☐ всё правильно