

Дерматовенерология

№1

Дайте определение межклеточного отека:

- 1 спонгиоз
- 2 акантоз
- 3 паракератоз
- 4 гипергранулез

№2

Укажите бесполостной экссудативный элемент:

- 1 пузырь
- 2 волдырь
- 3 пустула
- 4 узел

№3

К тяжелой форме псориаза относится:

- 1 эритродермия
- 2 псориаз ногтей
- 3 себорейный
- 4 каплевидный

№4

Для какой стадии псориаза характерна псориатическая триада:

- 1 прогрессирующей
- 2 регрессирующей
- 3 стационарной
- 4 хронической

№5

Для красного плоского лишая характерно:

- 1 поражение пушковых волос
- 2 появление папул с «пупковидным» вдавлением в центре
- 3 эритема на лице по типу «бабочки»
- 4 положительная йодная проба Бальцера

№6

Симптом Арди-Горчакова характерен для:

- 1 псориаза
- 2 пузырчатки
- 3 буллезного пемфигоида
- 4 чесотки

№7

Волдырь образуется при:

- 1 крапивнице
- 2 акантолитической пузырчатке
- 3 красном плоском лишае
- 4 эритезме

№8

Клиническое проявление разноцветного лишая:

- 1 пятна цвета «кофе с молоком»
- 2 гнойные корки
- 3 возникновение пустул

4 выпадение волос

№9

Для очагов при склеродермии характерно:

- 1 положительный симптом Никольского
- 2 эритема, уплотнение, атрофия
- 3 на поверхности обнаруживают *Treponema pallidum*
- 4 повышенная чувствительность к йоду

№10

Симптом «канцелярской кнопки» наблюдается при:

- 1 красной волчанке
- 2 псориазе
- 3 лепре
- 4 пятнистом лишае

№11

Регрессирующая стадия псориаза характеризуется:

- 1 появлением псевдоатрофического ободка Воронова
- 2 положительным феноменом псориазической триады
- 3 положительной изоморфной реакцией Кебнера
- 4 появлением милиарных папул

№12

Феномен «точечного кровотечения» при псориазе обусловлен:

- 1 папилломатозом
- 2 акантозом
- 3 гипергранулезом
- 4 гиперкератозом

№13

Чесотка может осложниться:

- 1 пиодермией
- 2 образованием свищей
- 3 очаговой алопецией
- 4 поражением внутренних органов

№14

Для эритразмы характерно:

- 1 реакция обострения Герксгеймера-Яриша-Лукашевича
- 2 очаги кирпично-коричневого цвета в крупных складках кожи
- 3 наличие буллезных высыпаний
- 4 симптом Пинкуса

№15

У больных отрубевидным лишаем наблюдается следующее:

- 1 пятна цвета «кофе с молоком»
- 2 локализация на ногтевых пластинках
- 3 образование скутул
- 4 локализация на ладонях и подошвах

№16

Выберите «атипичную» форму твердого шанкра:

- 1 шанкр-панариций
- 2 корковый шанкр
- 3 эрозивный шанкр
- 4 ожоговый шанкр

№17

С каким заболеванием дифференцируют твердый шанкр:

- 1 шанкриформной пиодермией
- 2 фавусом
- 3 вульгарным сикозом
- 4 эритразмой

№18

Реакция обострения Герксгеймера-Яриша-Лукашевича характерна для:

- 1 псориаза
- 2 красного плоского лишая
- 3 чесотки
- 4 вторичного периода сифилиса

№19

Симптом Пинкуса характерен для:

- 1 чесотки
- 2 красного плоского лишая
- 3 псориаза
- 4 вторичного периода сифилиса

№20

Симптом раннего врожденного сифилиса:

- 1 диффузная инфильтрация Гохзингера
- 2 наличие бугорков
- 3 наличие пятнистых элементов
- 4 диффузная алопеция

№21

Достоверные признаки позднего врожденного сифилиса:

- 1 лабиринтная глухота
- 2 радиарные рубцы Робинсона-Фурнье
- 3 псевдопаралич Парро
- 4 сифилитический ринит

№22

Гонорейный уретрит может осложниться:

- 1 простатитом
- 2 образованием скутул
- 3 фолликулярным гиперкератозом
- 4 онихогрифозом

№23

Какое заболевание вызывает *Neisseria gonorrhoeae*:

- 1 трихомоноз
- 2 гонорею
- 3 сифилис
- 4 микроспорию

№24

Укажите особенность возбудителя гонореи:

- 1 является диплококком
- 2 имеет спиралевидную форму
- 3 имеет грушевидную форму
- 4 представлен двумя клеточными формами

№25

Самая частая форма трихомониаза у женщин:

- 1 уретрит

- 2 вагинит
- 3 эндоцервицит
- 4 бартолинит

№26

Для изоморфной реакции Кебнера характерно:

- 1 появление новых высыпных элементов на месте травматизации кожи
- 2 появление акантолитических клеток Тцанка
- 3 появление рубцов на месте высыпных элементов
- 4 исход высыпных элементов в атрофию

№27

Для сифилитической розеолы характерно:

- 1 наличие муковидного шелушения на поверхности
- 2 положительная псориатическая триада
- 3 болезненность при поскабливании
- 4 исчезает при надавливании

№28

Розеолы при сифилисе дифференцируют с:

- 1 розовым лишаем Жибера
- 2 акантолитической пузырьчаткой
- 3 герпетиформным дерматитом Дюринга
- 4 шанкриформной пиодермией

№29

Симптом Пинкуса характерен для:

- 1 чесотки
- 2 красного плоского лишая
- 3 псориаза
- 4 вторичного периода сифилиса

№30

Патогномоничный симптом раннего врожденного сифилиса:

- 1 диффузная инфильтрация Гохзингера
- 2 наличие бугорков на коже туловища
- 3 пятнистые элементы на коже туловища
- 4 диффузная алопеция волосистой части головы

№31

Тяжелые формы псориаза:

- 1 эритродермия
- 2 экссудативный
- 3 себорейный
- 4 артропатический

№32

Пузырек состоит из:

- 1 дна
- 2 полости
- 3 ножки
- 4 покрышки

№33

Полостные морфологические элементы:

- 1 пятно
- 2 узел
- 3 пузырек

4 пузырь

№34

Вторичные морфологические элементы:

- 1 трещина
- 2 папула
- 3 пузырек
- 4 язва

№35

Бесполостные морфологические элементы:

- 1 бугорок
- 2 пузырь
- 3 пузырек
- 4 пятно

№36

Папула представляет собой:

- 1 первичный бесполостный эпидермально-дермальный элемент
- 2 первичный морфологический элемент, располагающийся в гиподерме
- 3 первичный морфологический элемент, выступающий над уровнем кожи
- 4 первичный морфологический элемент, всегда разрешающийся с образованием рубца

№37

Прогрессирующая стадия псориаза характеризуется:

- 1 появлением милиарных и лентикулярных папул
- 2 отсутствием венчика периферического роста
- 3 положительной изоморфной реакцией Кебнера
- 4 отрицательной псориатической триадой

№38

Псориаз ладоней и подошв дифференцируют с:

- 1 вторичным сифилисом
- 2 чесоткой
- 3 роговой экземой ладоней и подошв
- 4 дисгидротической экземой

№39

Симптом «псориатической триады» включает:

- 1 феномен «стеаринового пятна»
- 2 феномен «терминальной плёнки»
- 3 феномен «точечного кровотечения»
- 4 феномен «стружки»

№40

Пузырную форму красного плоского лишая дифференцируют с:

- 1 акантолитической пузырьчаткой
- 2 микроспорией
- 3 герпетиформным дерматитом Дюринга
- 4 отрубевидным лишаем

№41

В симптомокомплекс Лассюэра-Литтла входят:

- 1 мелкоочаговая алопеция подмышечных впадин и лобка
- 2 фолликулярный кератоз на разгибательных поверхностях конечностей
- 3 симптом Пинкуса
- 4 рубцовая алопеция волосистой части головы

№42

Для фурункула характерно:

- 1 является глубоким стафилококковым поражением
- 2 является глубоким стрептококковым поражением
- 3 возможно рецидивирующее течение
- 4 в воспалительный процесс вовлекается волосяной фолликул

№43

К глубоким стафилококковым поражениям кожи относятся:

- 1 фурункул
- 2 карбункул
- 3 фликтена
- 4 щелевидное импетиго

№44

Чесотка может осложняться:

- 1 склерозированием очагов
- 2 пиодермией
- 3 экзематизацией
- 4 поражением внутренних органов

№45

Для чесотки характерно:

- 1 отсутствие субъективных ощущений
- 2 зуд кожи в ночное время
- 3 локализация высыпаний по ходу нервных окончаний
- 4 наличие парных папул на коже туловища

№46

Для микробной экземы характерно:

- 1 асимметричность поражения
- 2 наличие пустул в экзематозном очаге
- 3 наличие бугорков в экзематозном очаге
- 4 положительная проба Бальцера

№47

Для атопического дерматита характерно:

- 1 белый дермографизм
- 2 начало в детском возрасте
- 3 зуд
- 4 наличие узлов в подкожно-жировой клетчатке

№48

С какими заболеваниями часто сочетается атопический дерматит:

- 1 с поллинозом
- 2 с вазомоторным ринитом
- 3 с бронхиальной астмой
- 4 со склеродермией

№49

Назовите симптомы острой крапивницы:

- 1 излюбленная локализация на коже шеи
- 2 острое начало
- 3 обильные уртикарные высыпания на туловище и конечностях
- 4 единичные папулы в области лица и шеи

№50

Для эритезмы характерно:

- 1 локализация в крупных складках

- 2 локализация на коже лица
- 3 очаги кирпично-коричневого цвета
- 4 наличие буллезных высыпаний

№51

К глубоким микозам относится:

- 1 рубромикоз
- 2 глубокий бластомикоз
- 3 зоонозная микроспория
- 4 хромомикоз

№52

Укажите симптомы дискоидной красной волчанки:

- 1 положительная йодная проба Бальцера
- 2 положительная йодная проба Ядассона
- 3 эритема на коже лица, напоминающая «бабочку»
- 4 болезненность при поскабливании высыпных элементов

№53

Стадии очаговой склеродермии кожи:

- 1 эритема и отек
- 2 склероз (уплотнение)
- 3 атрофия
- 4 гиперкератоз

№54

Клинические признаки первичного сифилиса:

- 1 твердый шанкр
- 2 регионарный лимфаденит
- 3 гуммы
- 4 алопеция

№55

Разновидности атипичных твердых шанкров:

- 1 шанкр-панариций
- 2 гуммозный шанкр
- 3 индуративный отек
- 4 шанкр-амигдалит

№56

Осложнения твердого шанкра:

- 1 баланопостит
- 2 парафимоз
- 3 индуративный отек
- 4 гангренизация

№57

Твердый шанкр сопровождается:

- 1 регионарным лимфаденитом
- 2 поражением волос и ногтевых пластинок
- 3 появлением бугорков на коже туловища
- 4 лимфангиитом

№58

Разновидности сифилитической лейкодермы:

- 1 сливная
- 2 сетчатая
- 3 мраморная

4 кружевная

№59

Клинические проявления вторичного свежего сифилиса:

- 1 остатки твердого шанкра
- 2 розеолы
- 3 положительные серологические реакции
- 4 гуммы

№60

Розеолы при сифилисе дифференцируют с:

- 1 розовым лишаем Жибера
- 2 акантолитической пузырчаткой
- 3 герпетиформным дерматитом Дюринга
- 4 отрубевидным лишаем