

Инфекционные болезни

№1

Для холеры характерно сочетание следующих симптомов:

- 1 обильный водянистый стул без запаха, отсутствие болей в животе, тошноты, лихорадки нет
- 2 тошнота, рвота, задержка стула, лихорадка
- 3 обильный водянистый зловонный стул, лихорадка
- 4 жидкий стул с примесью слизи и крови, диффузные боли в животе, лихорадки нет

№2

Генерализованную форму сальмонеллеза от локализованной отличает:

- 1 рвота
- 2 боли в животе
- 3 жидкий стул
- 4 гепатоспленомегалия

№3

Для гастроинтестинальной формы иерсиниоза характерны:

- 1 жидкий стул, боли в левой подвздошной области
- 2 жидкий стул без болей в животе
- 3 жидкий стул, боли в правой подвздошной области
- 4 жидкий стул, боли в желудке

№4

Какое звено патогенеза определяет тяжесть течения холеры?

- 1 интоксикация
- 2 изотоническая дегидратация
- 3 инвазия возбудителя в слизистую оболочку кишечника
- 4 генерализация инфекционного процесса

№5

Сочетание каких симптомов характерно для острой формы амебиоза?

- 1 боли в правой подвздошной области, жидкий водянистый стул
- 2 боли в правой подвздошной области, стул по типу «малинового желе»
- 3 рвота, отсутствие болей в животе, стул не изменен
- 4 высокая температура, жидкий с прожилками крови стул

№6

Симптом, не являющийся признаком декомпенсированного обезвоживания:

- 1 гипотермия
- 2 генерализованные судороги
- 3 гипертермия
- 4 анурия
- 5 отсутствие периферического пульса

№7

Сочетание каких симптомов характерно для ботулизма?

- 1 высокая температура, частый жидкий стул
- 2 высокая температура, нарушение сознания
- 3 нарушение зрения, глотания
- 4 судороги мышц, жидкий стул

№8

Какой процент потери массы тела бывает при алгидной форме холеры?

- 1 1-3%
- 2 4-6%

- 3 7-9%
4 10% и выше

№9

Укажите препарат, используемый в патогенетической терапии для лечения больного холерой III степени обезвоживания:

- 1 регидрон
2 цитроглюкосалан
3 5% раствор глюкозы
4 физиологический раствор
5 трисоль

№10

В каком биологическом субстрате больного можно обнаружить возбудитель холеры?

- 1 в крови
2 в моче
3 в кале
4 в слюне

№11

Первичная локализация патологического процесса в кишечнике при амебиазе:

- 1 прямая кишка
2 двенадцатиперстная кишка
3 слепая кишка и восходящий отдел толстой кишки
4 сигмовидная кишка

№12

Характер стула при колитическом варианте дизентерии:

- 1 обильный водянистый
2 обильный, типа «мясных помоев»
3 жидкий, типа «малинового желе»
4 скудный, с примесью слизи и прожилками крови

№13

Какие отделы нервной системы поражаются при ботулизме?

- 1 кора головного мозга
2 двигательные ядра продолговатого мозга
3 мозжечок
4 ганглии

№14

Какие клинические симптомы характерны для гастроинтестинальной формы сальмонеллеза?

- 1 тошнота, рвота, жидкий водянистый стул зеленоватого цвета, диффузные боли в животе, высокая температура
2 рвота без тошноты, без болей в животе, нормальная температура, жидкий стул с примесью крови
3 схваткообразные боли в животе, скудный стул, высокая температура
4 обильный водянистый стул типа «рисового отвара», без болей в животе, нормальная температура

№15

Антибактериальный препарат какой группы используется для лечения генерализованной формы иерсиниоза?

- 1 цефалоспорины
2 нитрофураны
3 сульфаниламиды
4 макролиды

№16

Препарат, который используется для лечения дизентерии колитического варианта тяжелого течения:

- 1 бензилпенициллин
2 доксициклин

- 3 сумамед
- 4 ципрофлоксацин

№17

Препарат для лечения больных сальмонеллезом I степени обезвоживания:

- 1 трисоль
- 2 хлосоль
- 3 дисоль
- 4 регидрон

№18

Какой биологический субстрат используется для подтверждения при сальмонеллезе гастроинтестинальной формы диагноза?

- 1 кровь
- 2 кал
- 3 моча
- 4 желчь

№19

Препарат для лечения больных пищевой токсикоинфекцией II степени обезвоживания:

- 1 тетрациклин
- 2 ципрофлоксацин
- 3 физиологический раствор
- 4 цитроглюкосолан

№20

Какое сочетание симптомов характерно для колитического варианта дизентерии?

- 1 высокая температура, тошнота, боли в эпигастрии, стул не изменен
- 2 высокая температура, боли в левой подвздошной области, скудный стул с примесью слизи и крови
- 3 нормальная температура, боли в правой подвздошной области, жидкий стул с примесью крови
- 4 высокая температура, диффузные боли в животе, обильный водянистый стул

№21

Какой материал используется для бактериологического подтверждения дизентерии?

- 1 кровь
- 2 моча
- 3 кал
- 4 желчь

№22

Какой препарат является решающим в лечении ботулизма?

- 1 пенициллин
- 2 ботулинический анатоксин
- 3 противоботулиническая антитоксическая сыворотка
- 4 реополиглюкин

№23

Какие варианты продромального периода встречаются при гепатите В наиболее часто?

- 1 гриппоподобный
- 2 диспепсический
- 3 артралгический
- 4 астеновегетативный

№24

Цитолиз печеночных клеток при вирусных гепатитах отражают биохимические тесты на определение:

- 1 уровня холестерина
- 2 уровня общего белка и белковых фракций крови
- 3 уровня аланинаминотрансферазы и аспарагинаминотрансферазы
- 4 уровня щелочной фосфатазы

№25

Какие ферменты отражают холестаза при вирусных гепатитах?

- 1 аланинаминотрансфераза
- 2 аспартатаминотрансфераза
- 3 цАМФ
- 4 щелочная фосфатаза

№26

Какие серологические маркеры характерны для гепатита А в остром периоде болезни?

- 1 HBsAg
- 2 anti-HBcor IgM
- 3 anti-HAV IgM
- 4 anti-HBe IgG
- 5 Anti-HBsAg

№27

Какой из серологических маркеров не характерен для гепатита В?

- 1 HBsAg
- 2 anti-HBcor IgM
- 3 anti-HAV IgM
- 4 anti-HBe IgM

№28

Какой симптом не характерен для острой печеночной недостаточности?

- 1 увеличение размеров печени
- 2 тахикардия
- 3 сокращение размеров печени
- 4 энцефалопатия
- 5 геморрагии

№29

Лечебная антитоксическая сыворотка:

- 1 противобруцеллезная
- 2 противоботулиническая
- 3 противосибиреязвенная
- 4 противоэнцефалитная

№30

Типичные изменения уровня билирубина и его фракций при вирусных гепатитах:

- 1 повышение уровня прямого билирубина
- 2 повышение уровня прямого и непрямого билирубина в одинаковой мере
- 3 повышение уровня непрямого билирубина
- 4 уровень прямого билирубина превалирует над уровнем непрямого билирубина

№31

Причина цитолиза печеночных клеток при вирусном гепатите В:

- 1 непосредственное воздействие вируса на гепатоциты
- 2 иммунный ответ на вирусные антигены и аутоантигены
- 3 поражение желчных ходов
- 4 лизис эритроцитов

№32

Какой биохимический тест можно использовать для ранней диагностики вирусных гепатитов?

- 1 белковые фракции крови
- 2 протромбиновый индекс
- 3 уровень аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы
- 4 уровень холестерина

5 уровень триглицеридов

№33

Какой вирусный гепатит чаще сопровождается хронизацией патологического процесс?

- 1 вирусный гепатит А
- 2 вирусный гепатит В
- 3 вирусный гепатит С
- 4 вирусный гепатит Е

№34

Наиболее частый исход гепатита А:

- 1 смерть
- 2 выздоровление
- 3 острая печеночная недостаточность
- 4 цирроз печени

№35

Какой симптом не характерен для лептоспироза?

- 1 интоксикация
- 2 интенсивные миалгии
- 3 поражение почек
- 4 обильный частый водянистый стул

№36

Какой симптом характерен для лептоспироза?

- 1 отсутствие желтухи
- 2 выраженные отеки нижних конечностей
- 3 полиурия
- 4 выраженные миалгии

№37

Причина кишечного кровотечения у больных брюшным тифом:

- 1 интоксикация
- 2 бактериемия
- 3 язвенное поражение лимфоидных образований тонкой кишки
- 4 кишечная непроходимость

№38

Какой симптом не характерен для брюшного тифа?

- 1 адинамия
- 2 дикротия пульса
- 3 эйфория
- 4 розеолезная сыпь
- 5 гепатоспленомегалия

№39

Характерные изменения в периферической крови при брюшном тифе в разгаре болезни:

- 1 нейтрофильный лейкоцитоз
- 2 лейкопения, относительный лимфоцитоз
- 3 лейкоцитоз, лимфоцитоз
- 4 лейкоцитоз, эозинофилия

№40

Какой симптом характерен для брюшного тифа?

- 1 гиперемия кожных покровов
- 2 папулезная сыпь
- 3 относительная брадикардия
- 4 тахикардия

№41

Сроки первичного появления сыпи при брюшном тифе:

- 1 1-3-й день болезни
- 2 4-7-й день болезни
- 3 8-10-й день болезни
- 4 11-14-й день болезни

№42

Длительность инкубационного периода при брюшном тифе:

- 1 несколько часов
- 2 2-3 суток
- 3 7-28 дней
- 4 30-55 дней

№43

В каком биологическом субстрате чаще обнаруживаются возбудители брюшного тифа в первую неделю заболевания?

- 1 в крови
- 2 в кале
- 3 в моче
- 4 в желчи

№44

Симптом, характерный для кишечного кровотечения у больных брюшным тифом:

- 1 боли в животе
- 2 положительный симптом Щеткина
- 3 тахикардия, снижение артериального давления

№45

Какой симптом брюшного тифа отсутствует на первой неделе болезни?

- 1 высокая температура
- 2 головная боль
- 3 розеолезная сыпь
- 4 слабость
- 5 анорексия

№46

Этиотропный препарат, который используется для лечения больных гриппом:

- 1 бисептол
- 2 арбидол
- 3 эритромицин
- 4 пенициллин

№47

Сочетание каких симптомов характерно для гриппа?

- 1 высокая температура, головная боль, миалгии, трахеит, непродуктивный ринит
- 2 субфебрильная температура, ларингит, ринит
- 3 высокая температура, увеличение миндалин, лимфатических узлов, фарингит
- 4 высокая температура, ларингит, конъюнктивит

№48

Какой симптом не характерен для аденовирусной инфекции?

- 1 высокая температура
- 2 фарингит
- 3 ринит
- 4 лимфаденопатия
- 5 артриты

№49

При каком остром респираторном вирусном заболевании назначается амиксин?

- 1 при гриппе
- 2 при парагриппе
- 3 при риновирусной инфекции
- 4 при аденовирусной инфекции

№50

Для какого острого респираторного вирусного заболевания характерен трахеит?

- 1 для гриппа
- 2 для парагриппа
- 3 для риновирусной инфекции
- 4 для аденовирусной инфекции
- 5 для респираторно-синцитиальной инфекции

№51

Для какого острого респираторного вирусного заболевания характерно осложнение «ложный круп»?

- 1 для гриппа
- 2 для парагриппа
- 3 для риновирусной инфекции
- 4 для аденовирусной инфекции
- 5 для респираторно-синцитиальной инфекции

№52

Какой симптом не характерен для парагриппа?

- 1 лимфаденопатия
- 2 кашель
- 3 насморк
- 4 осиплость голоса
- 5 повышение температуры

№53

Какое сочетание симптомов наиболее характерно для орнитоза?

- 1 лихорадка, пневмония
- 2 лихорадка, пневмония, лимфаденопатия
- 3 лихорадка, гепатоспленомегалия
- 4 лихорадка, пневмония, лимфаденопатия, гепатоспленомегалия

№54

Какие изменения периферической крови характерны для инфекционного мононуклеоза?

- 1 нейтрофильный лейкоцитоз
- 2 лейкопения с относительным лимфоцитозом
- 3 лейкоцитоз, лимфоцитоз, моноцитоз, атипичные мононуклеары
- 4 лейкопения, лимфоцитоз, моноцитоз
- 5 лейкоцитоз, нейтрофилез

№55

Сочетание каких симптомов наиболее характерно для инфекционного мононуклеоза?

- 1 лихорадка, лимфаденопатия, боли в животе
- 2 лихорадка, ангина, лимфаденопатия, диарея
- 3 лихорадка, ангина, лимфаденопатия, гепатоспленомегалия
- 4 лихорадка, спленомегалия

№56

Какой критерий менингококкового менингита является подтверждающим в результатах исследования ликвора?

- 1 плеоцитоз
- 2 снижение уровня сахара
- 3 лимфоцитарный плеоцитоз
- 4 обнаружение возбудителя

№57

Сыпь, характерная при менингококцемии:

- 1 пятнистая
- 2 утикарная
- 3 папулезная
- 4 геморрагическая с некрозом
- 5 пустулезная

№58

Какая суточная доза пенициллина верна для лечения менингококкового менингита средней тяжести, если вес больного 80 кг?

- 1 2 млн ЕД
- 2 6 млн ЕД
- 3 8 млн ЕД
- 4 24 млн ЕД

№59

Какое сочетание симптомов характерно для начала менингококкового менингита?

- 1 постепенное начало, головная боль, рвота, жидкий стул
- 2 быстрое повышение температуры, головная боль, рвота без болей в животе
- 3 высокая температура, рвота, боли в животе
- 4 высокая температура, головная боль, нарушение зрения

№60

Укажите препарат, который предпочтителен для лечения молниеносной инфекции, менингококцемии:

- 1 пенициллин
- 2 левомицетин
- 3 ампициллин
- 4 ампиокс

№61

Какие биологические субстраты используются для лабораторного подтверждения диагноза малярии?

- 1 кровь
- 2 кал
- 3 моча
- 4 желчь

№62

Какой тип лихорадки характерен для малярии?

- 1 постоянная
- 2 волнообразная
- 3 ремиттирующая
- 4 гектическая
- 5 перемежающаяся

№63

Длительность эритроцитарной шизогонии при трехдневной малярии:

- 1 24 ч
- 2 36 ч
- 3 48 ч
- 4 72 ч

№64

Какое осложнение может привести к летальному исходу при тропической малярии?

- 1 церебральная кома
- 2 дегидратационный шок
- 3 геморрагический шок
- 4 перитонит

5 острая дыхательная недостаточность

№65

Какой препарат действует на эритроцитарные формы плазмодия?

- 1 делагил
- 2 примахин
- 3 метрагил
- 4 хиноцид

№66

С каким возбудителем ассоциируется тяжелое течение малярии с развитием комы?

- 1 *Pl. vivax*
- 2 *Pl. ovale*
- 3 *Pl. malaria*
- 4 *Pl. falciparum*

№67

Препарат противорецидивного действия при малярии:

- 1 примахин
- 2 хинин
- 3 делагил
- 4 нитрофураны

№68

Укажите, что характерно для бубона чумы:

- 1 гиперемия кожи, безболезненность
- 2 гиперемия кожи, периаденит, болезненность
- 3 четкая конфигурация и плотность лимфатических узлов, безболезненность
- 4 кожа обычной окраски, незначительное увеличение лимфатического узла, безболезненность

№69

Сочетание каких симптомов характерно для бубонной формы туляремии?

- 1 лихорадка, бубон малоблезненный, гепатоспленомегалия
- 2 лихорадка, гепатоспленомегалия, пневмония
- 3 лихорадка, резко болезненный бубон, гепатоспленомегалия
- 4 лихорадка, карбункул, увеличение лимфатических узлов

№70

Какой антибактериальный препарат используется для лечения туляремии?

- 1 пенициллин
- 2 эритромицин
- 3 доксициклин
- 4 цефазолин

№71

Какая клиническая форма туляремии возникает при воздушно-пылевом пути заражения?

- 1 кожно-бубонная
- 2 бубонная
- 3 абдоминальная
- 4 легочная

№72

Что характерно для сибиреязвенного карбункула?

- 1 наличие болезненного фурункула с гнойным стержнем
- 2 наличие вала красного цвета вокруг язвы с черным струпом на дне язвы и отеком мягких тканей
- 3 наличие резко болезненной язвы с гнойным отделяемым
- 4 наличие болезненного карбункула, окруженного зоной гиперемии

№73

Какой антибактериальный препарат используется для лечения сибирской язвы?

- 1 пенициллин
- 2 сумамед
- 3 бисептол
- 4 линкомицин

№74

Ведущий симптом столбняка:

- 1 высокая температура
- 2 тонические судороги
- 3 параличи
- 4 нарушения сознания

№75

Сочетание симптомов, характерное для столбняка:

- 1 тризм, обильная саливация
- 2 тонические судороги, тризм, нарушение сознания
- 3 тризм, тонические судороги конечностей, туловища, ясное сознание
- 4 тризм, гидрофобия, параличи мышц конечностей

№76

Какой препарат используется для профилактики и лечения столбняка?

- 1 антимикробная сыворотка
- 2 антитоксическая сыворотка
- 3 бактериофаг
- 4 нормальная лошадиная сыворотка

№77

При какой клинической форме рожи более всего выражена болезненность в зоне очага?

- 1 при эритематозной
- 2 при эритематозно-геморрагической
- 3 при буллезной
- 4 при буллезно-геморрагической

№78

Какие симптомы не характерны для бешенства?

- 1 саливация
- 2 гидрофобия
- 3 аэрофобия
- 4 судорожный синдром
- 5 диарея

№79

Этиология пневмонии, наиболее характерная для ВИЧ-инфекции:

- 1 стафилококковая
- 2 пневмококковая
- 3 пневмоцистная
- 4 вирусная

№80

Сочетание каких симптомов характерно для ранней стадии ВИЧ-инфекции?

- 1 лихорадка, лимфаденопатия
- 2 лихорадка, опухолевые процессы
- 3 лихорадка, гепатоспленомегалия
- 4 лихорадка, увеличение пахового лимфатического узла

№81

Какой лабораторный тест наиболее достоверно подтверждает диагноз ВИЧ-инфекции?

- 1 клинический анализ крови
- 2 иммуноферментный анализ
- 3 соотношение Т-хелперов и Т-супрессоров
- 4 иммуноблотинг

№82

К каким субпопуляциям лимфоцитов тропен ВИЧ?

- 1 к Т-хелперам
- 2 к Т-супрессорам
- 3 к Т-киллерам

№83

Какой симптом не типичен для начальной фазы геморрагической лихорадки с почечным синдромом?

- 1 гиперемия и одутловатость лица
- 2 инъекция сосудов склер и конъюнктив
- 3 бледность кожных покровов
- 4 высокая температура
- 5 нарушение зрения

№84

Какое осложнение может привести к летальному исходу при геморрагической лихорадке с почечным синдромом?

- 1 кома
- 2 гиповолемия
- 3 острая почечная недостаточность
- 4 острая печеночная недостаточность
- 5 острая дыхательная недостаточность

№85

Какие патологические процессы характерны для геморрагической лихорадки с почечным синдромом?

- 1 вирусемия, поражение слизистых оболочек дыхательных путей
- 2 вирусемия, поражение стенки кровеносных сосудов и почек
- 3 вирусемия, поражение сосудов, желудочно-кишечного тракта

№86

При какой геморрагической лихорадке чаще развивается острая почечная недостаточность?

- 1 при омской
- 2 при крымской
- 3 при геморрагической лихорадке с почечным синдромом
- 4 при желтой

№87

Укажите наиболее частое сочетание симптомов у больных сыпным тифом:

- 1 высокая температура до 4 недель, головная боль, гепатоспленомегалия
- 2 высокая температура до 14 дней, головная боль, гиперемия лица, розеолезно-петехиальная сыпь
- 3 высокая волнообразная лихорадка, гепатоспленомегалия, боли в суставах
- 4 высокая температура до 3-4 недель, бледность кожных покровов, гепатоспленомегалия, розеолезная сыпь

№88

Какой лабораторный метод используется для подтверждения диагноза при сыпном тифе?

- 1 посев крови
- 2 серологические исследования с целью обнаружения специфических антител
- 3 микроскопия мазка крови
- 4 посев кала

№89

Сочетание симптомов, характерных для системного клещевого боррелиоза:

- 1 лихорадка, гепатоспленомегалия, розеолезная сыпь

- 2 лихорадка, кольцевидная мигрирующая эритема, кардиальные, неврологические поражения, артриты
- 3 лихорадка, артриты, макулезная сыпь
- 4 лихорадка, поражение сердца и суставов, везикулезная сыпь

№90

Укажите симптомы, не характерные для бруцеллеза:

- 1 волнообразная лихорадка
- 2 гепатоспленомегалия
- 3 артриты, миозиты
- 4 орхиты
- 5 остеопорозы трубчатых костей