

Оториноларингология

№1

Миндалина(-ы), имеющая(-ие) в своем строении лакуны:

- 1 язычная
- 2 небные
- 3 глоточная
- 4 трубные

№2

Охарактеризуйте III степень гипертрофии небных миндалин по Б.С. Преображенскому:

- 1 миндалины закрывают 1/3 просвета зева
- 2 миндалины закрывают 2/3 просвета зева
- 3 миндалины соприкасаются друг с другом

№3

С каким(-и) анатомическим(-и) образованием(-ями) с латеральной стороны граничит глотка?

- 1 с сосудисто-нервным пучком
- 2 с шейными позвонками
- 3 с полостью носа
- 4 с гортанью

№4

Наиболее частая локализация паратонзиллярного абсцесса:

- 1 задняя
- 2 передне-верхняя
- 3 боковая
- 4 срединная

№5

Симптом, характерный для аденоидов:

- 1 папулезная сыпь на лице
- 2 затрудненное носовое дыхание, приоткрытый рот во время сна
- 3 частые носовые кровотечения
- 4 нейросенсорная тугоухость

№6

Характерный(-ые) признак(-и) фолликулярной ангины:

- 1 налеты на миндалинах грязно-серого цвета
- 2 пробки в лакунах миндалин
- 3 подслизисто расположенные нагноившиеся фолликулы
- 4 язвенный дефект в верхнем полюсе миндалины

№7

Атипичная форма ангины:

- 1 лакунарная
- 2 фолликулярная
- 3 катаральная
- 4 герпетическая

№8

С помощью какой связки соединяются перстневидный и щитовидный хрящи?

- 1 эллиптической
- 2 конической
- 3 черпало-надгортанной
- 4 косой

№9

Какой нерв снабжает двигательными волокнами мышцы гортани?

- 1 блуждающий
- 2 лицевой
- 3 тройничный
- 4 подъязычный

№10

В классификации стенозов выделяют:

- 1 2 степени
- 2 3 степени
- 3 4 степени
- 4 5 степеней

№11

Отек какого отдела гортани возникает при ложном крупе?

- 1 вестибулярного
- 2 голосового
- 3 подголосового
- 4 межчерпаловидного

№12

При катаральном ларингите выявляются:

- 1 дисфония
- 2 симптомы дыхательной недостаточности
- 3 невозможность глотания
- 4 аутофония

№13

При аллергическом стенозе гортани II степени применяется:

- 1 трахеостомия
- 2 медикаментозное дестенозирование
- 3 коникотомия
- 4 тиреотомия

№14

Метод лечения при остром стенозе гортани IV стадии:

- 1 трахеостомия
- 2 коникотомия с последующей трахеостомией
- 3 медикаментозное дестенозирование
- 4 экстирпация гортани

№15

Ларингоскопическая картина, характерная для рака гортани:

- 1 «стекловидный» отек слизистой гортани
- 2 новообразование на широком основании с признаками изъязвления
- 3 новообразование с гладкой поверхностью
- 4 основание новообразования — тонкая ножка

№16

Локализация глоточного отверстия слуховой трубы:

- 1 боковая стенка носоглотки
- 2 задняя стенка носоглотки
- 3 верхняя стенка носоглотки
- 4 передняя стенка носоглотки

№17

Основной путь распространения инфекции при остром среднем отите:

- 1 тубарный (через слуховую трубу)
- 2 гематогенный
- 3 травматический
- 4 контактный

№18

Наиболее эффективный метод продувания слуховых труб:

- 1 Вальсальвы
- 2 Политцера
- 3 катетеризация
- 4 Тойнби

№19

Симптом, наиболее типичный для мезотимпанита:

- 1 центральная перфорация барабанной перепонки
- 2 слизисто-гнойное отделяемое с неприятным запахом
- 3 рубцовые изменения барабанной перепонки
- 4 перфорация в ненапрянутой части барабанной перепонки

№20

Локализация отосклеротического очага:

- 1 ушная раковина
- 2 наружный слуховой проход
- 3 барабанная полость
- 4 лабиринт

№21

В каком квадранте барабанной перепонки производится парацентез?

- 1 задне-нижнем
- 2 передне-нижнем
- 3 передне-верхнем
- 4 задне-верхнем

№22

Операция при хроническом гнойном среднем отите, отягощенном менингитом:

- 1 антромастотомия
- 2 saniрующая слухосохраняющая операция на височной кости
- 3 расширенная saniрующая слухосохраняющая операция на височной кости
- 4 тимпанопластика

№23

В какой носовой ход открывается слезно-носовой канал?

- 1 верхний
- 2 средний
- 3 нижний
- 4 общий

№24

Метод обследования полости носа:

- 1 мезофарингоскопия
- 2 передняя риноскопия
- 3 отоскопия
- 4 непряная ларингоскопия

№25

Наиболее характерный симптом острого гайморита:

- 1 гемианопсия
- 2 гиперакузия

- 3 боль при глотании
- 4 гнойное отделяемое в среднем носовом ходе

№26

Через какой носовой ход производятся пункции верхнечелюстных пазух?

- 1 верхний
- 2 нижний
- 3 средний
- 4 общий

№27

Какие околоносовые пазухи чаще всего поражаются в раннем детском возрасте?

- 1 клиновидные
- 2 решетчатые
- 3 верхнечелюстные
- 4 лобные

№28

Какое внутричерепное осложнение наиболее вероятно при фурункуле носа?

- 1 арахноидит задней черепной ямки
- 2 тромбоз кавернозного синуса
- 3 абсцесс височной доли
- 4 субдуральная гематома

№29

Лекарственный препарат, применяемый при аллергическом рините:

- 1 α-адреномиметики
- 2 топические назальные глюкокортикостероиды
- 3 масляный витаминный раствор
- 4 раствор антибиотика

№30

Наиболее характерный симптом гипертрофического ринита:

- 1 стойкое затруднение носового дыхания
- 2 боль в носу
- 3 приступы пароксизмального чихания
- 4 слизисто-гнойные выделения из носа