

## КОМПЕТЕНЦИЯ ОПК-5

|  |  |
|--|--|
| <p>ОПК-5 способен назначать лечение пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность</p> | <p><b>З-ОПК-5 знать:</b> методы назначения лечения пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность</p> <p><b>У- ОПК-5 уметь:</b> назначать лечение пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность</p> <p><b>В-ОПК-5 владеть:</b> методами назначения лечения пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность</p> |
|--|--|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <p>Перечень дисциплин</p> | <p><b>Обязательные дисциплины:</b><br/>Общие вопросы терапевтической патологии - 1 семестр<br/>Педиатрия – 2, 3 семестр<br/>Производственная практика (клиническая) – 1, 2, 3 семестры.</p> |
|---------------------------|---|

| Вопросы   | Ответы            |
|---|-------------------|
| <b>Общие вопросы терапевтической патологии - 1 семестр</b>  |                   |
| <p>1. Какое устройство наиболее обосновано в плане увеличения продолжительности жизни и уменьшения количества госпитализаций у больных с ХСН?<br/>Выберите правильный ответ:<br/>1 ИКД<br/>2 ЭКС в режиме DDDR<br/>3 CRT<br/>4 CRT-D (+)</p>  | 4                 |
| <p>2. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ:<br/>Какой препарат можно использовать при синдроме преждевременного возбуждения желудочков и фибрилляции предсердий для контроля ЧСС?</p>  | амиодарон         |
| <p>3. Что является абсолютным показанием к имплантации постоянного кардиостимулятора, у больного, перенесшего передний инфаркт миокарда?<br/>Выберите правильный ответ:<br/>1 блокада задней ветви левой ножки пучка гиса<br/>2 предсердная экстрасистолия и блокада передней ветви ножки пучка гиса<br/>3 атриовентрикулярная блокада дистальной локализации II и III степени<br/>4 блокада левой ножки пучка гиса</p> | 3                 |
| <p>4. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ:<br/>Какой бронхорасширяющий холинолитический препарат имеет пролонгированное действие?</p>   | тиотропиум бромид |
| <p>5. Какая группа препаратов является оптимальной в комбинации с ингаляционными глюкокортикоидами при лечении бронхиальной астмы?<br/>Выберите правильный ответ:<br/>1 антихолинергические препараты<br/>2 системные глюкокортикоиды<br/>3 б2-агонисты короткого действия</p>  | 4                 |

|  |   |
|--|---|
| 4 пролонгированные бронхолитики  |   |
| 6. Какие активные вещества входят в состав релвар эллипта?<br>Выберите правильный ответ:<br>1 формотерол+беклометазон<br>2 вилантерол+флутиказона фуроат<br>3 фенотерол гидробромид+будесонид<br>4 ипратрониум бромид+фенотерола гидробромид                             | 2   |
| 7. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ:<br>Какой препарат назначают при аспириновой бронхиальной астме?  | монтелукаст                                     |
| 8. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ:<br>Какими критериями определяется длительность использования антибиотиков при пневмониях?  | сроками ликвидации симптомов микробной агрессии |
| 9. Какой препарат используют для этиотропной терапии гриппа?<br>Выберите правильный ответ:<br>1 осельтамивир<br>2 циклоферон<br>3 терафлю<br>4 ацикловир   | 1   |
| 10. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ:<br>Какие лечебные мероприятия проводят при токсическом отеке легких?  | оксигенотерапию, применение мочегонных средств  |
| <b>Педиатрия – 2, 3 семестры</b>   |   |
| 1. Какие микроорганизмы чувствительны к бензилпенициллину?<br>Выберите правильный ответ:<br>1 стрептококки, пневмококки, спирохеты<br>2.стафилококки, гемофильная палочка, клебсиелла<br>3. микоплазмы, хламидии, легионеллы<br>4.кишечная палочка, протей, энтеробактер | 1   |
| 2. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ:<br>Какие побочные реакции чаще всего могут вызывать пенициллины?   | аллергические                                   |
| 3. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ:<br>Какая группа препаратов показана в начальный период ревматической атаки?  | пенициллины                                     |
| 4. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ:<br>Риск развития какого побочного эффекта увеличивается при одновременном использовании диклофенака и варфарина?   | кровотечения                                    |
| 5. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ:<br>Какая лекарственная форма глюкокортикоидов является наиболее оптимальной для лечения бронхиальной астмы?  | ингаляционная                                   |
| 6. Какой побочный эффект могут вызвать интраназальные кортикоステроиды?<br>Выберите правильный ответ:  | 3   |

|   |  |
|---|--|
| 1 осиплость голоса<br>2 угревая сыпь на лице<br>3 носовое кровотечение<br>4 остеопороз  |  |
| 7. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ:<br><br>При какой форме гломерулонефрита показано применение преднизолона с первых дней болезни   | При нефротической                        |
| 8. Какой препарат является местным глюкокортикоидом слабой силы?<br><br>Выберите правильный ответ:<br>1.мометазон<br>2 флутиказон<br>3 бетаметазон<br>4 преднизолон   | 4  |
| 9. В случае аллергии к пенициллину следует назначить<br><br>Выберите правильный ответ:<br>1 ампициллин<br>2.бициллин<br>3.оксациллин<br>4.цефорин   | 4  |
| 10. Какой препарат назначается при приступе печеночной колики?<br><br>Выберите правильный ответ:<br>1 калия перманганат<br>2 дротаверин<br>3 метоклопрамид<br>4 монтелукаст   | 2  |
| 11. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ:<br><br>Через сколько развивается клинический эффект интраназальных глюкокортикоидов?  | Через 3-4 дня                            |
| 12. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ:<br><br>При назначении какого препарата чаще возникает остеопороз  | ГКС                                      |
| 13. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ:<br><br>Какие антибиотики можно применять при лечении пневмонии у беременных?  | Пенициллины                              |
| 14. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ:<br><br>Каким раствором целесообразнее проводить промывание желудка в первые часы после отравления кислотами   | 4% р-р гидрокарбоната натрия             |
| 15. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ:<br><br>Чем следует промывать желудок ребенка при отравлении неизвестной этиологии   | Водой с добавлением активированного угля |
| 16. Какой у аминогликозидов наиболее характерный побочный эффект?<br><br>Выберите правильный ответ:<br>1 наличие высокого риска развития реакций гиперчувствительности<br>2 нарушение мозгового кровообращения<br>3 усиление моторики желудка<br>4 ототоксичность | 4  |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <p>17. У детей грудного возраста не рекомендуется применять в качестве жаропонижающего препарата</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.анальгин</li> <li>2.амидопирин</li> <li>3.ацетилсалициловую кислоту</li> <li>4.парацетамол</li> </ol>                         | 3                          |
| <p>18. Какой антибактериальный препарат применяется при лечении инфекций мочевыводящих путей, вызванных синегнойной палочкой?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 амоксициллин</li> <li>2 цефтазидим</li> <li>3 моксифлоксацин</li> <li>4 спирамицин</li> </ol>    | 2                          |
| <p>19. От чего зависит клиренс?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 скорости всасывания препарата</li> <li>2 биодоступности препарата</li> <li>3 массы печени и почек</li> <li>4 функционального состояния органов выведения</li> </ol>                            | 4                          |
| <p>20. При каком заболевании показаны ингибиторы протонной помпы?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 дивертикуле пищевода</li> <li>2 ахалазии кардии</li> <li>3 катаральном рефлюкс-эзофагите</li> <li>4 аксиальной грыже пищеводного отверстия</li> </ol>        | 3                          |
| <b>Производственная практика (клиническая) – 1, 2, 3 семестры</b>   |                            |
| <p>1. Какова потребность в белке доношенного новорожденного, находящегося на естественном вскармливании</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 5-2 г/кг в сутки</li> <li>2) 25-3.5 г/кг в сутки</li> <li>3) 6-4 г/кг в сутки</li> <li>4) 5,5 г/кг в сутки</li> </ol> | 2                          |
| <p>2. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ:</p> <p>Какой из перечисленных препаратов при длительном применении инактивирует витамин D и способствует развитию рахита</p>  | фенобарбитал               |
| <p>3. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ:</p> <p>Препаратором выбора при остром развитии приступа судорог является</p>  | седуксен                   |
| <p>4. Устранить депрессию дыхания при передозировке барбитуратов можно с помощью</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. промедола</li> <li>2. дроперидола</li> <li>3. бемегрида</li> <li>4. ГОМКа</li> <li>5. индерала</li> </ol>                                    | 3                          |
| <p>5. Какой препарат является препаратом выбора в лечении первичного билиарного холангита (первичного билиарного цирроза)?</p>  | урсодезоксихолевая кислота |

Выберите правильный ответ:

- 1 глицирризиновая кислота
- 2 эссенциальные фосфолипиды
- 3 урсодезоксихолевая кислота
- 4 адеметионин

6. Какие препараты противопоказаны для лечения бронхобструктивного синдрома при пищевой аллергии

Выберите правильный ответ:

- 1. интал
- 2. b2-адреномиметики
- 3. ксантиновые препараты
- 4. b-адреноблокаторы
- 5. антихолинергические

7. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ:

Какая максимальная суточная доза левомицетина не метаболизируется печенью новорожденного и вызывает токсический эффект

8. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ:

Какое лечение показано для "домашних" пневмоний

9. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ:

Какие антибиотики показаны для лечения хламидийной пневмонии?

10. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ:

Какой препарат необходимо немедленно назначить при астматическом статусе II-III степени

4

60 мг на кг

ампициллин

макролиды

Кортикостероиды