

КОМПЕТЕНЦИЯ ПК-2

<p>ПК-2 Назначение лечения пациентам при заболеваниях и(или) состояниях по профилю "педиатрия", контроль его эффективности и безопасности амбулаторно и в стационаре</p>	<p>З-ПК-2 Знать: методы назначения лечения пациентам при заболеваниях и(или) состояниях по профилю "педиатрия", контроль его эффективности и безопасности амбулаторно и в стационаре</p> <p>У-ПК-2 Уметь: назначать лечение пациентам при заболеваниях и(или) состояниях по профилю "педиатрия", контроль его эффективности и безопасности амбулаторно и в стационаре</p> <p>В-ПК-2 Владеть: методами назначения лечения пациентам при заболеваниях и(или) состояниях по профилю "педиатрия", контроль его эффективности и безопасности амбулаторно и в стационаре</p>
--	--

<p>Перечень дисциплин</p>	<p>Обязательные дисциплины: Общие вопросы терапевтической патологии - 1 семестр Педиатрия – 2,3 семестры Производственная практика (клиническая) – 1, 2, 3 семестры</p>
---------------------------	--

Вопросы	Ответы
Общие вопросы терапевтической патологии - 1 семестр	
<p>1. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой препарат должен быть рекомендован пациенту с синдромом Бругада при противопоказаниях к имплантации кардиовертер-дефибриллятора?</p>	хинидин
<p>2. Что является показанием для терапии антиаритмиками IV класса? Выберите правильный ответ: 1 пароксизмы фибрилляции предсердий 2 пароксизмы полиморфной желудочковой тахикардии типа «пируэт» 3 пароксизмы суправентрикулярной (монофокусной) тахикардии 4 пароксизмы трепетания предсердий</p>	2
<p>3. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Как называется препарат, рекомендуемый для купирования идиопатической желудочковой тахикардии с ЭКГ-признаками блокады правой ножки пучка Гиса с отклонением электрической оси влево?</p>	верапамил
<p>4. Как осуществляется подбор суточной дозы дабигатрана? Выберите правильный ответ: 1 под контролем международного нормализованного отношения 2 без контроля показателей коагулограммы 3 под контролем активированного частичного тромбопластинового времени 4 под контролем всех показателей коагулограммы</p>	2
<p>5. Какой препарат и в какой дозировке используют при обострении бронхиальной астмы при небулайзерной терапии? Выберите правильный ответ: 1 грудной сбор N4 до 5 мл</p>	2

2 сальбутамол в дозе 2,5 мг 3 амброксола гидрохлорид в дозе 30 мг 4 20% раствор п-ацетилцистеина 5 мл	
6. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: К чему приводит антибиотикотерапия хронического абсцесса легкого?	к ремиссии процесса
7. На сколько увеличивает эффективность лечения (%) включение в эрадикационные схемы инфекции helicobacter pylori препаратов висмута? Выберите правильный ответ: 1 7-8 2 40 3 3-5 4 15-20	4
8. Что относят к терапии первой линии для острой тромботической микроангиопатии? Выберите правильный ответ: 1 антибактериальную терапию 2 глюкокортикоиды 3 свежезамороженную плазму 4 циклофосфамид	3
9. Что может быть осложнением пульс-терапии метипредом? Выберите правильный ответ: 1 гипогликемия 2 понижение артериального давления 3 азотемия 4 иммунная депрессия	4
10. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: При каком виде пароксизмальной тахикардии наиболее эффективны вагусные пробы?	узловой ав-тахикардии
11. В какой стартовой дозе назначается илопрост взрослым пациентам (мкг на ингаляцию)? Выберите правильный ответ: 1 5,5 2 3,5 3 2,5 4 4,5	3
12. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: При лечении какой желудочковой тахикардии нередко эффективно применение внутривенного введения сернокислой магнезии?	пируэт
13. Применение каких препаратов у больных с удлинённым интервалом QT может увеличить риск летального исхода? Выберите правильный ответ: 1 бета-блокаторов 2 антиаритмических препаратов IA и IC классов 3 искусственного водителя ритма в сочетании с бета-блокаторами 4 симпатической денервации сердца в сочетании с бета-блокаторами	2
14. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Сколько по времени проводится пероральная антикоагулянтная терапия пациентам после протезирования клапана механическим	пожизненно

протезом?	
15. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что является противопоказанием к назначению статинов у женщин?	беременность
16. Какой препарат относят к антагонистам эндотелиновых рецепторов? Выберите правильный ответ: 1 бозентан 2 силденафил 3 вазапростан 4 пентоксифиллин	1
17. Что характерно для цефалоспоринов V поколения? Выберите правильный ответ: 1 анти - mrsa-активность 2 антисинегнойная активность 3 антианаэробная активность 4 лечение внутрибольничных пневмоний	1
18. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что является наиболее важным для лечения больного ХОБЛ?	обучение технике ингаляций и основам самоконтроля
19. Что является эффективным методом оценки контроля бронхиальной астмы? Выберите правильный ответ: 1 исследование спирометрии в динамике 2 контроль пульсоксиметрии 3 контроль эозинофилии в динамике 4 тест по контролю над астмой «АСТ»	4
Педиатрия– 2, 3 семестры	
1. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какая максимальная суточная доза левомицетина не метаболизируется печенью новорожденного и вызывает токсический эффект	60 мг на кг
2. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какие препараты необходимо назначить при дистрофии миокарда?	Витамин В15, бенфотиамина
3. У ребенка с анемией могут применяться все препараты, кроме Выберите правильный ответ: 1 пенициллина 2.левомицетина 3.сульфаниламидов 4.нитрофурановых производных	2
4. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой лучший препарат для профилактики суправентрикулярной пароксизмальной тахикардии у ребенка в возрасте 3 месяцев	дигоксин
5. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что относится к средствам, разжижающим мокроту путём разрушения сульфидных связей?	ацетилцистеин, мукодин
6. Что относят к ступенчатой терапии внебольничной пневмонии? Выберите правильный ответ: 1 этапное лечение (в стационаре и поликлинике) 2 применение физических упражнений с ходьбой по лестнице 3 двухэтапное применение антибактериальных препаратов: переход с парентерального на пероральный путь введения 4 галотерапию и массаж	3
7. С каких препаратов целесообразно начинать выведение ребенка 8 лет из приступа пароксизмальной тахикардии при АД 90/60 мм рт.	4

<p>ст.</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 дреналина внутривенно 2.дигоксина внутримышечно 3.индерала внутривенно 4.изоптина и кокарбоксилазы внутривенно 	
<p>8. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой препарат наиболее эффективен для профилактики частых приступов суправентрикулярной пароксизмальной тахикардии ребенку 10 лет с синдромом предвозбуждения желудочков</p>	Кордарон внутрь
<p>9. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Что относится к отрицательному эффекту искусственной вентиляции легких?</p>	уменьшение венозного возврата крови к сердцу
<p>10. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой препарат наиболее целесообразно назначить при инфекционно-токсической кардиопатии (дистрофии миокарда)?</p>	Оротат калия
Производственная практика (клиническая) – 1, 2, 3 семестры	
<p>11. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой метод введения гепарина наиболее эффективный</p>	подкожно
<p>12. Какой препарат не эффективен при пилорическом хеликобактериозе Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 де-нол 2.фуразолидон 3.препараты висмута 4.оксиферрискорбон содовый 	4
<p>13. Какой препарат для ликвидации синдрома пилороспазма не рекомендуется? Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 пипольфен 2.раствор 0.25% новокаина 3.церукал 4.седативные препараты 	3
<p>14. Какой препарат не обладает обволакивающими свойствами Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 де-нол 2.альмагель 3.отвар овса 4.метилурацил 	4
<p>15. Какой препарат не оказывает репаративного действия при язвенной болезни? Выберите правильный ответ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. солкосерил 2. оксиферрискорбон содовый 3. облепиховое масло 4. альмагель 	4
<p>1. Какие показатели обладают наибольшим значением для мониторинга состояния и оценки эффекта терапии при инфекции covid-19 при развитии острого респираторного дистресс-синдрома?</p>	2

Выберите правильный ответ:

- 1 лейкоцитоз, анемия
- 2 ил-6, д-димер
- 3 алт, аст
- 4 тропонин, nt pro-bnp

2. Какая медикаментозная профилактика при неспецифическом язвенном колите

Выберите правильный ответ:

- 1 ульфосалазин
- 2.средства, нормализующие состав флоры толстой кишки
- 3.спазмолитики
- 4.преднизолон длительно

3. Какие препараты необязательны для лечения дисхолии

Выберите правильный ответ:

- 1 гепатотропные
- 2.антиоксидантные
- 3.антимикробные
- 4.желчегонные

4. Какие препараты целесообразнее использовать при холецистите

Выберите правильный ответ:

- 1 фурановые
- 2.сульфамиды
- 3.ритромицин
- 4.тетрациклин

5. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ:

Какой препарат применяют с целью компенсации внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы?

2

3

1

минимикросфера
панкреатина