

КОМПЕТЕНЦИЯ ОПК-10

<p>ОПК-10 Способен участвовать в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства</p>	<p>З-ОПК-10 Знать: методы участия в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства</p> <p>У- ОПК-10 Уметь: участвовать в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства</p> <p>В- ОПК-10 Владеть: методами участия в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства</p>
---	---

<p>Перечень дисциплин</p>	<p>Обязательные дисциплины:</p> <p>Педиатрия – 3, 4 семестры</p> <p>Производственная практика (клиническая) – 3, 4 семестры</p>
---------------------------	--

Вопросы	Ответы
Педиатрия – 3, 4 семестры	
1. Какой препарат предпочтительнее использовать для оказания неотложной помощи при гипертоническом кризе? Выберите правильный ответ: 1 нифедипин 2 нитроглицерин 3 налаксон 4 но-шпу	1
2. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какие неотложные мероприятия проводят при острой надпочечниковой	введение глюкокортикоидов и глюкозы
3. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой препарат считают самым эффективным для неотложной терапии при развитии анафилактического шока?	адреналин
4. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что включает в себя неотложная помощь при внутрижелудочковой блокаде, развившейся в результате введения новокайнамида?	введение атропина
5. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Самый эффективный и безопасный метод восстановления синусового ритма при аритмогенном шоке?	проведение кардиоверсии
6. Что является антидотом при отравлении метанолом? Выберите правильный ответ: 1 этанол 2 барбитураты 3 бензодиазепины 4 амфетамины	1
7. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: В чем заключается лечение олигурии при гиповолемическом шоке?	восполнение объема циркулирующей крови
8. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ:	пункция плевральной

Что является приоритетным способом неотложной помощи при клапанном пневмотораксе?	полости
9. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Что является приоритетным способом применения лс при астматическом статусе?	с помощью небулайзера
10. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какое положение придают пациенту при приступе бронхиальной астмы?	сидя с упором наклонившись вперед
11. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Что является относительным противопоказанием к проведению тромболитической терапии?	обострение язвенной болезни
12. Что свидетельствует о правильности выполнения непрямого массажа сердца? Выберите правильный ответ: 1 видимое набухание шейных вен 2 наличие проводной пульсации на сонных артериях во время компрессии грудной клетки 3 наличие пульса на лучевой артерии 4 перелом ребер	2
13. Что необходимо сделать при первично зафиксированной фибрилляции желудочек или желудочковой тахикардии без пульса? Выберите правильный ответ: 1 ввести лидокаин 2 провести дефибрилляцию 3 ввести амиодарон 4 ввести атропин	2
14. С чего необходимо начинать оказание помощи при желудочковой тахикардии без пульса до готовности работы дефибрилятора? Выберите правильный ответ: 1 внутривенного введения адреналина 2 внутривенного введения наркотического анальгетика для обезболивания перед проведением дефибрилляции 3 обеспечения проходимости верхних дыхательных путей 4 непрямого массажа сердца	4
15. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Сколько секунд должна составлять пауза до и после нанесения разряда ручного дефибрилятора?	не более 10
16. До появления чего проводится промывание желудка? Выберите правильный ответ: 1 остатков пищи 2 чистых промывных вод 3 желчи 4 мутных промывных вод	2
17. Что относят к клиническим признакам обтурации верхних	4

<p>дыхательных путей</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <p>1 осиплость голоса, кашель 2 звонкий голос, сухой кашель 3 сухой кашель со свистящими хрипами 4 цианоз, нарушение дыхания, отсутствие голоса, кашля</p>	
<p>18. Сколько составляет начальная скорость инфузии 0,9% раствора хлорида натрия при анафилактическом шоке взрослому?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <p>1 20 мл/кг в первые 10-15 минут 2 10 мл/кг в первые 10-20 минут 3 10 мл/кг в первые 20 минут 4 5-10 мл/кг в первые 5-10 минут</p>	4
<p>19. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ:</p> <p>Как называется прием, применяемый для удаления инородного тела из дыхательных путей?</p>	Геймлиха
<p>20. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ:</p> <p>В каком положении госпитализируют пациента при желудочно-кишечном кровотечении?</p>	лёжа с приподнятым головным концом
Производственная практика (клиническая) – 3, 4 семестры	
<p>1. Какое правильное соотношение компрессии и вентиляции при проведении комплекса СЛР у взрослого?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <p>1 30:2 2 15:2 3 5:1 4 5:2</p>	1
<p>2. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ:</p> <p>Какие мероприятия неотложной помощи проводятся при анафилаксии с асфиксиею и гипотонией?</p>	обеспечение проходимости дыхательных путей
<p>3. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ:</p> <p>Что необходимо выполнить при декомпенсированном стенозе гортани?</p>	трахеостомию
<p>4. Для предотвращения чего выполняется прием Селлика?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <p>1 ларингоспазма 2 регургитации желудочного содержимого 3 рвоты 4 травмы голосовых складок</p>	2
<p>5. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ:</p> <p>Какой препарат является препаратом выбора для купирования пароксизма мерцательной тахиаритмии?</p>	амиодарон
<p>6. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ:</p> <p>Что является показанием к проведению электрической кардиоверсии при пароксизмальных тахиаритмиях?</p>	развитие острой сердечной недостаточности
<p>7. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ:</p>	ларингоскоп

Что необходимо для интубации трахеи?	
8. Какой антидот вводится при отравлении опиатами? Выберите правильный ответ: 1 кордиамин 2 унитиол 3 налоксон 4 атропин	3
9. Какая доза фуросемида необходима при купировании отёка лёгких внутривенно? Выберите правильный ответ: 1 10 – 20 2 20 – 40 3 40 – 60 4 60 – 120	4
10. Какой препарат первой линии используют при терапии обострения бронхиальной астмы? Выберите правильный ответ: 1 фуросемид 2 эуфиллин 3 сальбутамол 4 морфин	3
11. Какой препарат является препаратом выбора при желудочковой тахикардии типа «пируэт»? Выберите правильный ответ: 1 сульфат магния 2 амиодарон 3 лидокаин 4 аспаркам	1
12. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что вводится внутривенно при рефрактерной фибрилляции желудочков?	амиодарона
13. Под контролем чего проводят внутривенное введение нитроглицерина при остром коронарном синдроме без подъема сегмента st? Выберите правильный ответ: 1 частоты дыхательных движений 2 частоты сердечных сокращений 3 насыщения крови кислородом 4 артериального давления	4
14. При лечении неосложненного гипертонического криза используется Выберите правильный ответ: 1 конкор, индап 2 гипотиазид, энам 3 амлодипин, лориста 4 каптоприл, моксонидин	4
15. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой препарат является препаратом выбора при асистолии во время сердечно-легочной реанимации?	эпинефрин

<p>16. Что необходимо в лечении инфаркта миокарда осложненного застоем в малом круге кровообращения?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <p>1 краткосрочная внутривенная инфузия левосимендана на фоне гипотонии</p> <p>2 применение ингибиторов апф при сопутствующей хронической почечной недостаточности и повышенного артериального давления</p> <p>3 внутривенная инфузия кардиотонических лекарственных средств на фоне гиповолемии</p> <p>4 внутривенная инфузия нитратов у больных без артериальной гипотонии</p>	4
<p>17. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Что необходимо ввести внутривенно инфузионно больному в состоянии кардиогенного шока с выраженной артериальной гипотонией?</p>	допамин
<p>18. Применение каких препаратов необходимо избегать в лечении инфаркта миокарда правого желудочка?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <p>1 кардиотоников</p> <p>2 кристаллоидов</p> <p>3 нитратов</p> <p>4 вазопрессоров</p>	3
<p>19. Назначение какого препарата является необходимым в остром периоде высоковероятной тромбоэмболии лёгочной артерии?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <p>1 морфина</p> <p>2 гепарина</p> <p>3 кардиомагнила</p> <p>4 эуфиллина</p>	2
<p>20. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что является признаком восстановления сердечной деятельности?</p>	появление пульсации на сонных артериях