

## КОМПЕТЕНЦИЯ УК-1

<p>УК-1 способен критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте</p>	<p>З-УК-1 знать: методы критического и системного анализа, определения возможностей и способов применения достижений в области медицины и фармации в профессиональном контексте</p> <p>У-УК-1 уметь: критически и системно анализировать, определять возможности и способы применения достижений в области медицины и фармации в профессиональном контексте</p> <p>В-УК-1 владеть: методами критического и системного анализа, определения возможностей и способов применения достижений в области медицины и фармации в профессиональном контексте</p>
---	---

<p>Перечень дисциплин</p>	<p><b>Обязательные дисциплины:</b> Педиатрия – 3, 4 семестры Клиническая фармакология – 4 семестр</p>
---------------------------	---

Вопросы	Ответы
<b>Педиатрия – 3, 4 семестры</b>	
1. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что является ведущим отличительным симптомом холестатической желтухи?	кожный зуд
2. Где локализуются ценкеровские дивертикулы? Выберите правильный ответ: 1 в поддиафрагмальной части пищевода 2 в сигмовидной кишке 3 в задней стенке глотки и пищевода (+) 4 в 12-перстной кишке	3
3. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой степени соответствуют сливные эрозии между двумя складками слизистой пищевода по лос-анджелесской эндоскопической классификации рефлюкс-эзофагита?	C
4. С чем связано обострение алкогольного хронического гломерулонефрита? Выберите правильный ответ: 1 с переохлаждением 2 с обострением хронического тонзиллита 3 с алкогольным эксцессом 4 с употреблением соленой пищи	3
5. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой гормон играет основную роль в регуляции концентрирования мочи?	антидиуретический гормон
6. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какое заболевание является причиной повторных гемартрозов у пациентов?	гемофилия
7. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Как называется поражение костной ткани при хронической болезни почек?	почечная остеодистрофия
8. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какое поражение кожи характерно для болезни Лайма?	мигрирующая эритема
9. Что чаще поражается при системной склеродермии?	4

<p>Выберите правильный ответ:</p> <p>1 тонкая кишка 2 толстая кишка 3 печень 4 пищевод</p>	
<p>10. Выберите одну из клинических форм системной склеродермии:</p> <p>1 линейная склеродермия 2 склероатрофический лихен 3 лимитированная форма 4 морфea</p>	3
<p>11. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какие эпителиальные клетки в мокроте свидетельствуют о неправильно собранном материале?</p>	многослойного плоского эпителия
<p>12. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какие характерные изменения кожных покровов наблюдаются у больных со стенозом устья аорты?</p>	бледность
<p>13. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что относят к гистологическому паттерну острой интерстициальной пневмонии?</p>	диффузные альвеолярные повреждения
<p>14. Что необходимо прежде всего подозревать длительное кровохарканье при сухом кашле? Выберите правильный ответ:</p> <p>1 кавернозную форму туберкулёза лёгких 2 рак бронхов 3 пневмонию 4 бронхэкстatischeкую болезнь</p>	2
<p>15. Что является наиболее важным показателем для диагностики нефротического синдрома? Выберите правильный ответ:</p> <p>1 протеинурия 2 артериальная гипертензия 3 изостенурия 4 гиперхолестеринемия</p>	1
<p>16. Какой провокационный тест является наиболее информативным при экзогенном аллергическом альвеолите? Выберите правильный ответ:</p> <p>1 ингаляционный тест с соответствующим антигеном 2 внутрикожный тест с соответствующим антигеном 3 тест с физической нагрузкой на велоэргометре 4 тест с бронхолитиками</p>	2
<p>17. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Через сколько часов от начала появления симптомов начинается повышаться содержание МВ-фракции креатинфосфокиназы в крови при инфаркте миокарда?</p>	через четыре
<p>18. При наличии на исходной ЭКГ каких изменений результаты нагрузочного ЭКГ-теста при диагностике ИБС нельзя интерпретировать корректно? Выберите правильный ответ:</p> <p>1 вольтажных признаков гипертрофии левого желудочка</p>	2

2 синдрома wpw 3 нижне-предсердного ритма 4 неполной блокады правой ножки пучка гиса	
19. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: При какой форме аритмии пути риэнтри локализуются в атриовентрикулярном узле?	атриовентрикулярной узловой тахикардии
20. Какой симптом может быть обнаружен при общем осмотре пациента с аортальной недостаточностью? Выберите правильный ответ: 1 Ровзинга 2 Воскресенского 3 Мюссе 4 Ситковского	3
<b>Клиническая фармакология – 4 семестр</b>	
1. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какие побочные реакции чаще всего могут вызывать пенициллины?	аллергические
2. Какие микроорганизмы чувствительны к бензилпенициллину? Выберите правильный ответ: 1 стрептококки, пневмококки, спирохеты 2 стафилококки, гемофильная палочка, клебсиелла 3 микоплазмы, хламиидии, легионеллы 4 кишечная палочка, протей, энтеробактер	1
3. Какие побочные реакции могут вызвать тетрациклины? Выберите правильный ответ: 1 нарушение образования костной и зубной ткани 2 нарушение слуха и вестибулярного аппарата 3 неврит зрительного нерва, дисульфирамоподобный эффект 4 апластическую анемию, агранулоцитоз	1
4. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какое поражение верхних дыхательных путей является показаниями к назначению макролидов?	острый тонзиллит
5. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Риск развития какого побочного эффекта увеличивается при одновременном использовании диклофенака и варфарина?	кровотечения
6. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какая лекарственная форма глюкокортикоидов является наиболее оптимальной для лечения бронхиальной астмы?	ингаляционная
7. Какая группа препаратов наиболее активно снижает риск эрозий от нестероидных противовоспалительных препаратов? Выберите правильный ответ: 1 спазмолитики 2 препараты висмута 3 ингибиторы протонной помпы 4 h-2 блокаторы	3
8. Какой побочный эффект могут вызвать интраназальные кортикостероиды? Выберите правильный ответ: 1 осиплость голоса 2 угревая сыпь на лице	3

3 носовое кровотечение 4 остеопороз	
9. Какой препарат является местным глюкокортикоидом слабой силы?  Выберите правильный ответ: 1 мометазон 2 флутиказон 3 бетаметазон 4 преднизолон	4
10. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какую специфическую нежелательную реакцию может вызвать тикагрелор?	одышку
11. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Через сколько развивается клинический эффект интраназальных глюкокортикоидов?	через 3-4 дня
12. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какое исследование следует обязательно выполнить пациенту перед увеличением дозы левотироксина натрия?	электрокардиограмму
13. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой препарат для лечения артериальной гипертензии следует назначить больным, перенесшим инфаркт миокарда?	бета-адреноблокатор
14. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что является противопоказанием к применению пентоксифиллина?	повышенная чувствительность к метилксантинам
15. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что относят к наиболее типичным побочным эффектам пенициллинов?	крапивницу
16. Какой у аминогликозидов наиболее характерный побочный эффект?  Выберите правильный ответ: 1 наличие высокого риска развития реакций гиперчувствительности 2 нарушение мозгового кровообращения 3 усиление моторики желудка 4 ототоксичность	4
17. Какой препарат является препаратом выбора для лечения остеомиелита?  Выберите правильный ответ: 1 азитромицин 2 полимиксин в 3 линкомицин 4 пенициллин	3
18. Какой антибактериальный препарат применяется при лечении инфекций мочевыводящих путей, вызванных синегнойной палочкой?  Выберите правильный ответ: 1 амоксициллин	2

2 цефтазидим 3 моксифлоксацин 4 спирамицин	
19. От чего зависит клиренс? Выберите правильный ответ: 1 скорости всасывания препарата 2 биодоступности препарата 3 массы печени и почек 4 функционального состояния органов выведения	4
20. Какой лекарственный препарат увеличивает риск кровотечений у пациентов с поражением печени? Выберите правильный ответ: 1 каптоприл 2 амикацин 3 варфарин 4 нифедипин	3

20. Какой лекарственный препарат увеличивает риск кровотечений у пациентов с поражением печени?

Выберите правильный ответ:

1 каптоприл

2 амикацин

3 варфарин

4 нифедипин