

КОМПЕТЕНЦИЯ ПК-2

ПК-2 Назначение лечения взрослым пациентам при заболеваниях и(или) состояниях сердечно-сосудистой системы, контролировать его эффективность и безопасность амбулаторно и в стационаре	3-ПК-2 Знать: методы назначения лечения взрослым пациентам при заболеваниях и(или) состояниях сердечно-сосудистой системы, контролировать их эффективность и безопасность амбулаторно и в стационаре У-ПК-2 Уметь: назначать лечение взрослым пациентам при заболеваниях и(или) состояниях сердечно-сосудистой системы, контролировать их эффективность и безопасность амбулаторно и в стационаре В-ПК-2 Владеть: методами назначения лечения взрослым пациентам при заболеваниях и(или) состояниях сердечно-сосудистой системы, контролировать их эффективность и безопасность амбулаторно и в стационаре
---	--

Перечень дисциплин	Обязательные дисциплины: Общие вопросы терапевтической патологии - 1 семестр Кардиология – 2 семестр Производственная практика (клиническая) – 1, 2 семестры
--------------------	--

Вопросы	Ответы
Общие вопросы терапевтической патологии - 1 семестр	
1. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой препарат должен быть рекомендован пациенту с синдромом Бругада при противопоказаниях к имплантации кардиовертер-дефибриллятора?	хинидин
2. Прочтите задание и выберите верный вариант ответа: Что является показанием для терапии антиаритмиками IV класса? 1 пароксизмы фибрилляции предсердий 2 пароксизмы полиморфной желудочковой тахикардии типа «пируэт» 3 пароксизмы суправентрикулярной (монофокусной) тахикардии 4 пароксизмы трепетания предсердий	2
3. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Как называется препарат, рекомендуемый для купирования идиопатической желудочковой тахикардии с ЭКГ-признаками блокады правой ножки пучка Гиса с отклонением электрической оси влево?	верапамил
4. Прочтите задание и выберите верный вариант ответа: Как осуществляется подбор суточной дозы дабигатрана? 1 под контролем международного нормализованного отношения 2 без контроля показателей коагулограммы 3 под контролем активированного частичного тромбопластинового времени 4 под контролем всех показателей коагулограммы	2

<p>5. Прочтите задание и выберите верный вариант ответа: Какой препарат и в какой дозировке используют при обострении бронхиальной астмы при небулайзерной терапии?</p> <p>1 грудной сбор №4 до 5 мл 2 сальбутамол в дозе 2,5 мг 3 амброксола гидрохлорид в дозе 30 мг 4 20% раствор н-ацетилцистеина 5 мл</p>	2
<p>6. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: К чему приводит антибиотикотерапия хронического абсцесса легкого?</p>	к ремиссии процесса
<p>7. Прочтите задание и выберите верный вариант ответа: На сколько увеличивает эффективность лечения (%) включение в эрадикационные схемы инфекции <i>helicobacter pylori</i> препаратов висмута?</p> <p>1 7-8 2 40 3 3-5 4 15-20</p>	4
<p>8. Прочтите задание и выберите верный вариант ответа: Что относят к терапии первой линии для острой тромботической микроангиопатии?</p> <p>1 антибактериальную терапию 2 глюкокортикоиды 3 свежезамороженную плазму 4 циклофосфамид</p>	3
<p>9. Прочтите задание и выберите верный вариант ответа: Что может быть осложнением пульс-терапии метипредом?</p> <p>1 гипогликемия 2 понижение артериального давления 3 азотемия 4 иммунная депрессия</p>	4
<p>10. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: При каком виде пароксизмальной тахикардии наиболее эффективны вагусные пробы?</p>	узловой ав-тахикардии
<p>11. Прочтите задание и выберите верный вариант ответа: В какой стартовой дозе назначается илопрост взрослым пациентам (мкг на ингаляцию)?</p> <p>1 5,5 2 3,5 3 2,5 4 4,5</p>	3
<p>12. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: При лечении какой желудочковой тахикардии нередко эффективно применение внутривенного введения сернокислой магнезии?</p>	пируэт

<p>13. Прочтите задание и выберите верный вариант ответа:</p> <p>Применение каких препаратов у больных с удлинённым интервалом QRS увеличить риск летального исхода?</p> <p>1 бета-блокаторов 2 антиаритмических препаратов Ia и Ic классов 3 искусственного водителя ритма в сочетании с бета-блокаторами 4 симпатической денервации сердца в сочетании с бета-блокаторами</p>	2
<p>14. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ:</p> <p>Сколько по времени проводится пероральная антикоагулянтная терапия пациентам после протезирования клапана механическим протезом?</p>	пожизненно
<p>15. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ:</p> <p>Что является противопоказанием к назначению статинов у женщин?</p>	беременность
<p>16. Прочтите задание и выберите верный вариант ответа:</p> <p>Какой препарат относят к антагонистам эндотелиновых рецепторов?</p> <p>1 бозентан 2 силденафил 3 вазапростан 4 пентоксифиллин</p>	1
<p>17. Прочтите задание и выберите верный вариант ответа:</p> <p>Что характерно для цефалоспоринов V поколения?</p> <p>1 анти-MRSA-активность 2 антисинегнойная активность 3 антианаэробная активность 4 лечение внутрибольничных пневмоний</p>	1
<p>18. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ:</p> <p>Что является наиболее важным для лечения больного ХОБЛ?</p>	обучение технике ингаляций и основам самоконтроля
<p>19. Прочтите задание и выберите верный вариант ответа:</p> <p>Что является эффективным методом оценки контроля бронхиальной астмы?</p> <p>1 исследование спирометрии в динамике 2 контроль пульсоксиметрии 3 контроль эозинофилии в динамике 4 тест по контролю над астмой «аст»</p>	4
<p>20. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ:</p> <p>Препарат выбора для лечения артериальной гипертензии при гестозе беременности?</p>	метилдопа
Кардиология – 2 семестр	
<p>1. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ:</p> <p>Какой препарат необходимо назначить всем пациентам с ИБС при</p>	препараты ацетилсалicyловой

отсутствии противопоказаний?	кислоты
2. Прочтите задание и выберите верный вариант ответа: Какой препарат является препаратом выбора при повышении внутриглазного давления? 1 маннитол 2 тимолол 3 индапамид 4 спиронолактон	2
3. Прочтите задание и выберите верный вариант ответа: Какой препарат может устраниить внутриглазную блокаду, развившуюся после введения новокаинамида? 1 оксигенотерапии 2 1 мл атропина 0,1% 3 80-100 мл раствора гидрокарбоната натрия 4% 4 10 мл раствора хлористого кальция 10%	3
4. Прочтите задание и выберите верный вариант ответа: Какой препарат противопоказан при возникновении экстрасистолии на фоне постинфарктного кардиосклероза? 1 верапамил 2 метопролол тартрат 3 пропранолол 4 амиодарон	1
5. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой препарат необходимо использовать в качестве антиаритмической терапии у пациентов с фибрилляцией предсердий и фракцией выброса менее 40%?	амиодарон
6. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой препарат применяют в лечении желудочковой тахикардии, возникающей во время физической нагрузки?	бета-адреноблокатор
7. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: При каком нарушении ритма катетерная абляция медленного пути ав соединения является наиболее предпочтительным способом лечения?	ав узловой тахикардии
8. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какие препараты уменьшают толщину слоя интима-медиа сонных артерий?	блокаторы кальциевых каналов
9. Прочтите задание и выберите верный вариант ответа: Как требуется вводить протамина сульфат для нейтрализации действия гепарина? 1 болясом однократно 2 в виде длительной инфузии 3 болясом 3 раза с интервалом 2 ч 4 болясом один или два раза	2
10. Прочтите задание и выберите верный вариант ответа: Какие препараты являются препаратами первой линии для лечения стенокардии напряжения? 1 ингибиторы апф	3

2 нитраты 3 бета-адреноблокаторы 4 антикоагулянты	
Производственная практика (клиническая) – 1, 2 семестры	
1. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой препарат является препаратом выбора для купирования идиопатической желудочковой тахикардии с ЭКГ-признаками блокады правой ножки пучка Гиса с отклонением электрической оси влево?	верапамил
2. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какие диуретики предпочтительны для старта мочегонной терапии при хронической сердечной недостаточности?	петлевые
3. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой препарат является препаратом выбора для лечения пациентов с АГ и нарушениями ритма (синусовая брадикардия, синдром слабости синусового узла, АВ-блокады)?	дигидропиридиновый антагонист кальция
4. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какие препараты предпочтительно назначать пациентам с ХБП при лечении артериальной гипертонии с позиции кардио-нефропротекции?	блокаторы РААС
5. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какие препараты применяют в качестве препаратов первой линии для лечения атерогенных дислипидемий?	статины
6. Прочтайте задание и выберите верный вариант ответа: Когда показано назначение диуретиков больному хронической сердечной недостаточностью (ХСН)? 1 при диастолической дисфункции левого желудочка 2 при ХСН Ia-III стадии при наличии застойных явлений 3 при фракции выброса левого желудочка <25% 4 при фибрилляции предсердий при любом ФК ХСН	2
7. Прочтайте задание и выберите верный вариант ответа: Какие препараты улучшают прогноз у пациентов с хронической сердечной недостаточностью? 1 антагонисты кальция 2 диуретики 3 статины 4 ингибиторы АПФ	4
8. Прочтайте задание и выберите верный вариант ответа: Какие препараты необходимо назначить для лечения лабильной артериальной гипертонии у больных с гиперкинетическим типом кровообращения в первую очередь? 1 препараты центрального действия 2 мочегонные средства 3 антагонисты кальция 4 бета-адреноблокаторы	4
9. Прочтайте задание и выберите верный вариант ответа: При каком состоянии больному хронической сердечной	1

недостаточностью показан приём дигоксина?

1 фибрилляции предсердий

2 наджелудочковой тахикардии на фоне синдрома wpw

3 ав-блокады ii степени

4 синусовой тахикардии

10. Прочтите задание и выберите верный вариант ответа:

Аритмогенность какого препарата увеличивается после перенесенного инфаркта миокарда?

1 бисопролол

2 хинидин

3 дигоксин

4 верапамил

2