

## КОМПЕТЕНЦИЯ ПК-2

<p>ПК-2 Назначение лечения пациентам при заболеваниях и (или) состояниях нервной системы, контроль его эффективности и безопасности</p>	<p>З-ПК-2 Знать: методы назначения лечения пациентам при заболеваниях и (или) состояниях нервной системы, контроль его эффективности и безопасности          У-ПК-2 Уметь: назначать лечение пациентам при заболеваниях и (или) состояниях нервной системы, контроль его эффективности и безопасности          В-ПК-2 Владеть: методами назначения лечения пациентам при заболеваниях и (или) состояниях нервной системы, контроль его эффективности и безопасности</p>
---	---

<p>Перечень дисциплин</p>	<p><b>Обязательные дисциплины:</b>          Общие вопросы терапевтической патологии - 1 семестр          Неврология – 2 семестр          Производственная практика (клиническая) – 1, 2 семестры</p>
---------------------------	--

Вопросы	Ответы
<b>Общие вопросы терапевтической патологии - 1 семестр</b>	
<p>1. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ:          Какой препарат должен быть рекомендован пациенту с синдромом Бругада при противопоказаниях к имплантации кардиовертер-дефибриллятора?</p>	хинидин
<p>2. Что является показанием для терапии антиаритмиками IV класса?          Выберите правильный ответ:          1 пароксизмы фибрилляции предсердий          2 пароксизмы полиморфной желудочковой тахикардии типа «пируэт»          3 пароксизмы суправентрикулярной (монофокусной) тахикардии          4 пароксизмы трепетания предсердий</p>	2
<p>3. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ:          Как называется препарат, рекомендуемый для купирования идиопатической желудочковой тахикардии с ЭКГ-признаками блокады правой ножки пучка Гиса с отклонением электрической оси влево?</p>	верапамил
<p>4. Как осуществляется подбор суточной дозы дабигатрана?          Выберите правильный ответ:          1 под контролем международного нормализованного отношения          2 без контроля показателей коагулограммы          3 под контролем активированного частичного тромбопластинового времени          4 под контролем всех показателей коагулограммы</p>	2
<p>5. Какой препарат и в какой дозировке используют при обострении бронхиальной астмы при небулайзерной терапии?          Выберите правильный ответ:          1 грудной сбор N4 до 5 мл          2 сальбутамол в дозе 2,5 мг          3 амброксола гидрохлорид в дозе 30 мг          4 20% раствор n-ацетилцистеина 5 мл</p>	2
<p>6. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ:          К чему приводит антибиотикотерапия хронического абсцесса легкого?</p>	к ремиссии процесса

<p>7. На сколько увеличивает эффективность лечения (%) включение в эрадикационные схемы инфекции <i>helicobacter pylori</i> препаратов висмута?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <p>1 7-8 2 40 3 3-5 4 15-20</p>	4
<p>8. Что относят к терапии первой линии для острой тромботической микроангиопатии?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <p>1 антибактериальную терапию 2 глюкокортикоиды 3 свежезамороженную плазму 4 циклофосфамид</p>	3
<p>9. Что может быть осложнением пульс-терапии метипредом?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <p>1 гипогликемия 2 понижение артериального давления 3 азотемия 4 иммунная депрессия</p>	4
<p>10. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: При каком виде пароксизмальной тахикардии наиболее эффективны вагусные пробы?</p>	узловой ав-тахикардии
<p>11. В какой стартовой дозе назначается илопрост взрослым пациентам (мкг на ингаляцию)?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <p>1 5,5 2 3,5 3 2,5 4 4,5</p>	3
<p>12. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: При лечении какой желудочковой тахикардии нередко эффективно применение внутривенного введения сернокислой магнезии?</p>	пируэт
<p>13. Применение каких препаратов у больных с удлинённым интервалом q увеличить риск летального исхода?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <p>1 бета-блокаторов 2 антиаритмических препаратов ia и ic классов 3 искусственного водителя ритма в сочетании с бета-блокаторами 4 симпатической денервации сердца в сочетании с бета-блокаторами</p>	2
<p>14. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Сколько по времени проводится пероральная антикоагулянтная терапия пациентам после протезирования клапана механическим протезом?</p>	пожизненно
<p>15. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что является противопоказанием к назначению статинов у женщин?</p>	беременность
<p>16. Какой препарат относят к антагонистам эндотелиновых рецепторов?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <p>1 бозентан 2 силденафил 3 вазапростан 4 пентоксифиллин</p>	1
<p>17. Что характерно для цефалоспоринов V поколения?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p>	1

1 анти - mrsa-активность 2 антисинегнойная активность 3 антианаэробная активность 4 лечение внутрибольничных пневмоний	
18. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что является наиболее важным для лечения больного ХОБЛ?	обучение технике ингаляций и основам самоконтроля
19. Что является эффективным методом оценки контроля бронхиальной астмы? Выберите правильный ответ: 1 исследование спирометрии в динамике 2 контроль пульсоксиметрии 3 контроль эозинофилии в динамике 4 тест по контролю над астмой «АСТ»	4
<b>Неврология – 2 семестр</b>	
20. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой препарат первой линии назначают для купирования острого мигренозного приступа?	триптаны
21. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой критерий эффективности используют для оценки терапии рассеянного склероза?	Отсутствие новых очагов по МРТ и рецидивов
22. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой лабораторный показатель контролируют при длительном приеме карбамазепина?	Уровень печеночных ферментов (АЛТ, АСТ)
23. Какой препарат является средством первой линии для купирования острого приступа мигрени? 1 Ибuproфен 2 Парацетамол 3 Суматриптан 4 Диазепам	3
24. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой метод применяют для оценки эффективности реабилитации после инсульта?	Шкала Рэнкина
25. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой препарат выбора используют для лечения болезни Паркинсона на ранних стадиях?	Леводопа
26. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой параметр оценивают при контроле безопасности терапии варфарином?	МНО
27. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой метод диагностики применяют для раннего выявления токсической нейропатии при химиотерапии?	ЭНМГ
28. Какой показатель необходимо контролировать при длительной терапии валпроевой кислотой? 1 Уровень креатинина 2 Уровень печеночных ферментов (АЛТ, АСТ) 3 Уровень глюкозы крови 4 Уровень калия	2
29. Какой метод используют для оценки эффективности реабилитации после ишемического инсульта? 1 Электроэнцефалография (ЭЭГ) 2 Шкала Рэнкина 3 УЗИ сосудов шеи 4 Электрокардиография (ЭКГ)	2
<b>Производственная практика (клиническая) – 1, 2 семестры</b>	
31. Какой препарат является препаратом выбора для купирования	1

эпилептического статуса у взрослых? 1 Лоразепам 2 Парацетамол 3 Аспирин 4 Метопролол	
32. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой клинический тест проводят для дифференциальной диагностики паркинсонического tremora и эссенциального tremора?	Проба с нагрузкой
33. Какой симптом является патогномоничным для болезни Паркинсона? 1 Тремор покоя 2 Интенционный tremor 3 Гиперрефлексия 4 Нистагм	1
34. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой препарат является средством выбора для длительной терапии идиопатической эпилепсии у взрослых?	Леветирацетам
35. Какой тест проводят для диагностики туннельного синдрома запястного канала? 1 Проба Тинеля 2 Проба Ромберга 3 Пальценосовая проба 4 Коленный рефлекс	1
36. Какой препарат является средством первой линии для лечения рассеянного склероза с ремиттирующим течением? 1) Интерферон бета-1а 2) Карбамазепин 3) Аспирин 4) Метформин	1
37. Какой препарат является средством выбора для купирования острой боли при невралгии тройничного нерва? 1) Ибuproфен 2) Карбамазепин 3) Парацетамол 4) Диклофенак	2
38. Какой метод диагностики является наиболее информативным при подозрении на грыжу межпозвонкового диска поясничного отдела? 1) Рентгенография позвоночника 2) МРТ поясничного отдела позвоночника 3) УЗИ мягких тканей спины 4) Электронейромиография (ЭНМГ)	2
39. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: К какой группе препаратов относится дроперидол?	нейролептики
40. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой препарат является антидотом при отравлении наркотическими анальгетиками?	налоксон