

КОМПЕТЕНЦИЯ ПК-2

ПК-2 Назначение лечения пациентам при заболеваниях и (или) состояниях нервной системы, контроль его эффективности и безопасности	<p>З-ПК-2 Знать: методы назначения лечения пациентам при заболеваниях и (или) состояниях нервной системы, контроль его эффективности и безопасности</p> <p>У-ПК-2 Уметь: назначать лечение пациентам при заболеваниях и (или) состояниях нервной системы, контроль его эффективности и безопасности</p> <p>В-ПК-2 Владеть: методами назначения лечения пациентам при заболеваниях и (или) состояниях нервной системы, контроль его эффективности и безопасности</p>
--	---

Перечень дисциплин	<p>Обязательные дисциплины:</p> <p>Неврология – 3, 4 семестры</p> <p>Клиническая фармакология – 4 семестр</p> <p>Производственная практика (клиническая) – 3, 4 семестры</p> <p>Дисциплины по выбору:</p> <p>Эндокринные заболевания у больных неврологического профиля – 3 семестр</p> <p>Аnestезиология и интенсивная терапия у больных неврологического профиля – 3 семестр</p> <p>Производственная практика: освоение профессиональных умений на симуляторах и тренажерах - 4 семестр</p>
--------------------	---

Вопросы	Ответы
Неврология – 3, 4 семестры	
1. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой препарат первой линии назначают для купирования острого мигренозного приступа?	триптаны
2. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой критерий эффективности используют для оценки терапии рассеянного склероза?	Отсутствие новых очагов по МРТ и рецидивов
3. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой лабораторный показатель контролируют при длительном приеме карбамазепина?	Уровень печеночных ферментов (АЛТ, АСТ)
4. Какой препарат является средством первой линии для купирования острого приступа мигрени? 1 Ибупрофен 2 Парацетамол 3 Суматриптан 4 Диазепам	3
5. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой метод применяют для оценки эффективности реабилитации после инсульта?	Шкала Рэнкина
6. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой препарат выбора используют для лечения болезни Паркинсона на ранних стадиях?	Леводопа
7. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой параметр оценивают при контроле безопасности терапии варфарином?	МНО
8. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой метод диагностики применяют для раннего выявления токсической нейропатии при химиотерапии?	ЭНМГ
9. Какой показатель необходимо контролировать при длительной терапии валпроевой кислотой?	2

1 Уровень креатинина	
2 Уровень печеночных ферментов (АЛТ, АСТ)	
3 Уровень глюкозы крови	
4 Уровень калия	
10. Какой метод используют для оценки эффективности реабилитации после ишемического инсульта?	2
1 Электроэнцефалография (ЭЭГ)	
2 Шкала Рэнкина	
3 УЗИ сосудов шеи	
4 Электрокардиография (ЭКГ)	
Клиническая фармакология – 4 семестр	
1. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: В отношении каких вирусов активен препарат умифеновир (арбидол)?	вирусов гриппа А и В
2. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: При приеме каких препаратов может возникнуть обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки?	НПВС
3. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой препарат является основным в базисной терапии ревматоидного артрита?	метотрексат
4. Какой препарат является препаратом выбора для проведения «пульс-терапии» ревматоидного артрита? Выберите правильный ответ: 1 дексаметазон 2 гидрокортизон 3 беклометазон 4 метилпреднизолон	4
5. Что является абсолютным противопоказанием для назначения ингибиторов АПФ? Выберите правильный ответ: 1 сахарный диабет 2 нарушение функции почек 3 сухой кашель 4 двухсторонний стеноз почечных артерий	4
6. Какой биологический препарат назначают при болезни крона? Выберите правильный ответ: 1 сульфасалазин 2 метотрексат 3 преднизолон 4 адалимумаб	4
7. К чему приводит применение высоких доз спиронолактона у мужчин? Выберите правильный ответ: 1 гипертрофии околоушных желез 2 микоза стоп 3 алопеции 4 гинекомастии	4
Производственная практика (клиническая) – 3, 4 семестры	
1. Какой препарат является препаратом выбора для купирования эпилептического статуса у взрослых? 1 Лоразепам 2 Парацетамол 3 Аспирин 4 Метопролол	1
2. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ:	Проба с нагрузкой

Какой клинический тест проводят для дифференциальной диагностики паркинсонического тремора и эссенциального тремора?	
3. Какой симптом является патогномоничным для болезни Паркинсона? 1 Тремор покоя 2 Интенционный тремор 3 Гиперрефлексия 4 Нистагм	1
4. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой препарат является средством выбора для длительной терапии идиопатической эпилепсии у взрослых?	Леветирацетам
5. Какой тест проводят для диагностики туннельного синдрома запястного канала? 1 Проба Тинеля 2 Проба Ромберга 3 Пальценосявая проба 4 Коленный рефлекс	1
6. Какой препарат является средством первой линии для лечения рассеянного склероза с ремиттирующим течением? 1) Интерферон бета-1а 2) Карбамазепин 3) Аспирин 4) Метформин	1
7. Какой препарат является средством выбора для купирования острой боли при невралгии тройничного нерва? 1) Ибупрофен 2) Карбамазепин 3) Парацетамол 4) Диклофенак	2
8. Какой метод диагностики является наиболее информативным при подозрении на грыжу межпозвонкового диска поясничного отдела? 1) Рентгенография позвоночника 2) МРТ поясничного отдела позвоночника 3) УЗИ мягких тканей спины 4) Электронейромиография (ЭНМГ)	2
Эндокринные заболевания у больных неврологического профиля – 3 семестр	
1. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Что является единственным методом лечения сахарного диабета 1 типа?	инсулинотерапия
2. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: За сколько вводится инсулин короткого действия при близком к нормальному уровне гликемии?	за 20-30 минут
3. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Что является активной формой витамина D?	кальцитриол
4. Какой препарат является препаратом выбора для лечения центрального гипотиреоза: Выберите правильный ответ: 1 генно-инженерный тиреолиберин 2 рекомбинантный тТГ человека 3 левотироксин натрия 4 препараты йода	3

<p>5. Что является абсолютным противопоказанием к применению комбинированных оральных контрацептивов? Выберите правильный ответ: 1 тромбоз глубоких вен 2 надпочечниковая недостаточность 3 язвенная болезнь желудка 4 первичный гипотиреоз</p>	1
Анестезиология и интенсивная терапия у больных неврологического профиля – 3 семестр	
<p>1. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: К какой группе препаратов относится дроперидол?</p>	нейролептики
<p>2. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой препарат следует применять целях профилактики приступов стенокардии в предоперационном периоде?</p>	нитросорбид
<p>3. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой препарат является антидотом при отравлении наркотическими анальгетиками?</p>	налоксон
<p>4. Что относят к естественным коллоидным плазмозаменителям? Выберите правильный ответ: 1 реомакродекс 2 гелофузин 3 альбумин 4 полиглюкин</p>	3
<p>5. При введении каких препаратов чаще всего возникают аллергические реакции? Выберите правильный ответ: 1 антигистаминных препаратов 2 антиагрегантов 3 антибиотиков 4 антикоагулянтов</p>	3
Производственная практика: освоение профессиональных умений на симуляторах и тренажерах - 4 семестр	
<p>1. Что включает тройной прием по Сафара? Выберите правильный ответ: 1 разгибание головы назад, выведение нижней челюсти вперед, открытие рта 2 поворот головы пострадавшего на бок, открывание рта, валик под голову 3 освобождение от стесняющей одежды области шеи 4 прием селика</p>	1
<p>2. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Что является первой мерой помощи больному при эпилептическом статусе?</p>	введение воздуховода в ротоглотку
<p>3. Чем следует корректировать дыхательный ацидоз? Выберите правильный ответ: 1 лактатом натрия 2 гидрокарбонатом натрия 3 искусственной вентиляцией легких 4 трисамином</p>	3
<p>4. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Что является наиболее эффективным методом оксигенации при реанимации?</p>	интубация трахеи и ИВЛ

5. Когда необходимо прекратить реанимационные мероприятия?

Выберите правильный ответ:

- 1 при появлении судорог
- 2 при появлении асистолии на мониторе
- 3 при появлении пульса на сонной артерии
- 4 при расширении зрачков

3