

КОМПЕТЕНЦИЯ ОПК-5

<p>ОПК-5 способен назначать лечение пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность</p>	<p>З-ОПК-5 знать: методы назначения лечения пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность</p> <p>У- ОПК-5 уметь: назначать лечение пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность</p> <p>В-ОПК-5 владеть: методами назначения лечения пациентам при заболеваниях и (или) состояниях, контролировать его эффективность и безопасность</p>
--	---

<p>Перечень дисциплин</p>	<p>обязательные дисциплины: общие вопросы терапевтической патологии - 1 семестр терапия – 2 семестр производственная практика (клиническая) – 1, 2 семестры.</p>
---------------------------	---

вопросы	ответы
Общие вопросы терапевтической патологии - 1 семестр	
<p>1. Какое устройство наиболее обосновано в плане увеличения продолжительности жизни и уменьшения количества госпитализаций у больных с ХСН? Выберите правильный ответ:</p> <p>1 ИКД 2 ЭКС в режиме DDDR 3 CRT 4 CRT-D (+)</p>	4
<p>2. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой препарат можно использовать при синдроме преждевременного возбуждения желудочков и фибрилляции предсердий для контроля ЧСС?</p>	амиодарон
<p>3. Что является абсолютным показанием к имплантации постоянного кардиостимулятора, у больного, перенесшего передний инфаркт миокарда? Выберите правильный ответ:</p> <p>1 блокада задней ветви левой ножки пучка гиса 2 предсердная экстрасистолия и блокада передней ветви ножки пучка гиса 3 атриовентрикулярная блокада дистальной локализации II и III степени 4 блокада левой ножки пучка гиса</p>	3
<p>4. Прочтайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой бронхорасширяющий холинолитический препарат имеет пролонгированное действие?</p>	тиотропиум бромид
<p>5. Какая группа препаратов является оптимальной в комбинации с ингаляционными глюкокортикоидами при лечении бронхиальной астмы? Выберите правильный ответ:</p> <p>1 антихолинергические препараты</p>	4

2 системные глюкокортикоиды 3 б2-агонисты короткого действия 4 пролонгированные бронхолитики	
6. Какие активные вещества входят в состав релвар эллипта? Выберите правильный ответ: 1 формотерол+беклометазон 2 вилантерол+флутиказона фуроат 3 фенотерол гидробромид+бudesонид 4 ипратрониум бромид+фенотерола гидробромид	2
7. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой препарат назначают при аспириновой бронхиальной астме?	монтелукаст
8. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какими критериями определяется длительность использования антибиотиков при пневмониях?	сроками ликвидации симптомов микробной агрессии
9. Какой препарат используют для этиотропной терапии гриппа? Выберите правильный ответ: 1 осельтамивир 2 циклоферон 3 терафлю 4 ацикловир	1
10. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какие лечебные мероприятия проводят при токсическом отеке легких?	оксигенотерапию, применение мочегонных средств
Терапия – 2 семestr	
1. Результаты какого исследования продемонстрировали дополнительную пользу от назначения статинов больным АГ с умеренной гиперхолестеринемией (<=6.5 ммоль/л)? Выберите правильный ответ: 1 action 2 ascot-lla (+) 3 atheroma 4 allhat	2
2. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Чем характеризуется особенность стимуляции в режиме ААI при наличии дисфункции синусового узла?	наличием нормального ав-проведения
3. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что обычно вызывает восстановление проходимости окклюзированной коронарной артерии под влиянием тромболитической терапии у больных инфарктом миокарда?	появление желудочковых аритмий
4. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Сколько должна продолжаться антикоагулянтная терапия после восстановления синусового ритма у больных клапанной	пожизненно

фибрилляцией?	
5. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой антиишемический препарат вызывает побочный эффект в виде изъязвлений кожи и слизистых различной локализации?	никорандил
6. Что отражает первая позиция в буквенном коде у электрокардиостимулятора? Выберите правильный ответ: 1 стимулируемую камеру 2 детектируемую камеру 3 код производителя 4 наличие функции частотной адаптации	1
7. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Препарат выбора у пациентов с синдромом бругада для уменьшения выраженности элевации сегмента st и лечения «ритмического шторма»?	хинидин
8. На сколько снижают в неделю по (в миллиграммах) суточную дозу преднизолона при индукционном курсе лечения язвенного колита? Выберите правильный ответ: 1 5 2 10 3 20 4 30	1
9. Что является показанием к стентированию главного панкреатического протока? Выберите правильный ответ: 1 выраженное уплотнение паренхимы поджелудочной железы 2 множественные структуры главного панкреатического протока 3 расположение структур в головке поджелудочной железы 4 наличие кальцинатов в протоках	3
10. Какой препарат назначается при приступе печеночной колики? Выберите правильный ответ: 1 калия пермanganат 2 дротаверин 3 метоклопрамид 4 монтелукаст	2
11. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой препарат наиболее эффективен для снятия болей при эзофагите?	рабепразол
12. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какая группа препаратов относится к вспомогательным средствам при лечении бронхиальной астмы?	метилксантины
13. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какие антибиотики можно применять при лечении пневмонии у беременных?	Пенициллины

14. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: При каком заболевании наиболее эффективно проведение санационной бронхоскопии?	хроническом гнойном бронхите с бронхэкстазами
15. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой препарат используют для контроля синтеза мочевой кислоты при подагре?	аллопуринол
16. При каком заболевании наиболее показано местное лечение с использованием свечей? Выберите правильный ответ: 1 хроническом энтерите 2 проктите 3 неспецифическом язвенном колите 4 хроническом панкролите	2
17. Сколько составляют (в мг) оптимальные дозы гипотиазида при лечении гипертонии? Выберите правильный ответ: 1 25-100 2 6,25-12,5 3 25-50 4 12,5-25	4
18. Сколько должен продолжаться прием двойной антиагрегантной терапии после стентирования ствола левой коронарной артерии? Выберите правильный ответ: 1 10 месяцев 2 12 месяцев 3 два года 4 не более полугода	2
19. Применение каких препаратов не оправдано в лечении больных с декомпенсированным легочным сердцем? Выберите правильный ответ: 1 антагонистов альдостерона 2 растворов нитроглицерина 3 сердечных гликозидов 4 блокаторов кальциевых каналов	3
20. При каком заболевании показаны ингибиторы протонной помпы? Выберите правильный ответ: 1 дивертикуле пищевода 2 ахалазии кардии 3 катаральном рефлюкс-эзофагите 4 аксиальной грыже пищеводного отверстия	3
Производственная практика (клиническая) – 1, 2 семестры	
1. Что является показанием для оперативного лечения при наличии выраженной аортальной недостаточности у бессимптомных пациентов с сохранной фракцией выброса левого желудочка согласно рекомендациям европейского общества кардиологов 2017 г? Выберите правильный ответ: 1 увеличение конечно-систолического размера левого желудочка более 50 мм	1

<p>2 увеличение конечно-диастолического размера левого желудочка от 50 до 70 мм 3 увеличение размеров левого предсердия 4 увеличение размеров правого предсердия</p>	
<p>2. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Антиишемический препарат, не оказывающим клинически значимого влияния на АД и ЧСС?</p>	ранолазин
<p>3. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что является средством выбора при частых приступах тахиаритмии у больных с синдромом wpw?</p>	катетерная абляция дополнительного проводящего пути
<p>4. Что необходимо сделать, если у больного со стенозом устья аорты без признаков недостаточности кровообращения и коронарной недостаточности появились обмороки при физических усилиях? Выберите правильный ответ: 1 назначить препараты, улучшающие инотропную функцию миокарда 2 решить вопрос о возможности хирургического лечения порока 3 провести консультации врача-кардиохирурга для решения вопроса о возможности установки кардиостимулятора 4 провести обследования с целью исключения тромбоэмболии мелких ветвей легочной артерии</p>	2
<p>5. Какой препарат является препаратом выбора в лечении первичного билиарного холангита (первичного билиарного цирроза)? Выберите правильный ответ: 1 глицирризиновая кислота 2 эссенциальные фосфолипиды 3 урсодезоксихолевая кислота 4 адеметионин</p>	урсодезоксихолевая кислота
<p>6. какой препарат является препаратом первой линии для лечения артериальной гипертензии при диабетической нефропатии на стадии микроальбуминурии? Выберите правильный ответ: 1 амлодипин 2 небиволол 3 лизиноприл 4 карведилол</p>	3
<p>7. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какие препараты применяю для лечения хронического аутоиммунного активного гепатита?</p>	глюкокортикоиды
<p>8. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что используют для купирования приступа фибрилляции предсердий?</p>	амиодарон
<p>9. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какие антибиотики показаны для лечения хламидийной пневмонии?</p>	макролиды

10. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ:
Что является показанием к назначению ингибиторов апф у пациентов со стабильной стенокардией напряжения?

сопутствующий
атеросклероз
брехеоцефальных артерий