

КОМПЕТЕНЦИЯ ПК-2

<p>ПК-2 Назначение лечения взрослым пациентам при заболеваниях и(или) состояниях по профилю "терапия", контроль его эффективности и безопасности амбулаторно и в стационаре</p>	<p>З-ПК-2 Знать: методы назначения лечения взрослым пациентам при заболеваниях и(или) состояниях по профилю "терапия", контроль его эффективности и безопасности амбулаторно и в стационаре</p> <p>У-ПК-2 Уметь: назначать лечение взрослым пациентам при заболеваниях и(или) состояниях по профилю "терапия", контроль его эффективности и безопасности амбулаторно и в стационаре</p> <p>В-ПК-2 Владеть: методами назначения лечения взрослым пациентам при заболеваниях и(или) состояниях по профилю "терапия", контроль его эффективности и безопасности амбулаторно и в стационаре</p>
---	---

<p>Перечень дисциплин</p>	<p>Обязательные дисциплины: Общие вопросы терапевтической патологии - 1 семестр Терапия – 2 семестр Производственная практика (клиническая) – 1, 2 семестры</p>
---------------------------	---

Вопросы	Ответы
Общие вопросы терапевтической патологии - 1 семестр	
1. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой препарат должен быть рекомендован пациенту с синдромом бругада при противопоказаниях к имплантации кардиовертера-дефибриллятора?	хинидин
2. Что является показанием для терапии антиаритмиками IV класса? Выберите правильный ответ: 1 пароксизмы фибрилляции предсердий 2 пароксизмы полиморфной желудочковой тахикардии типа «пируэт» 3 пароксизмы суправентрикулярной (монофокусной) тахикардии 4 пароксизмы трепетания предсердий	2
3. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Как называется препарат, рекомендуемый для купирования идиопатической желудочковой тахикардии с ЭКГ-признаками блокады правой ножки пучка Гиса с отклонением электрической оси влево?	верапамил
4. Как осуществляется подбор суточной дозы дабигатрана? Выберите правильный ответ: 1 под контролем международного нормализованного отношения 2 без контроля показателей коагулограммы 3 под контролем активированного частичного тромбопластинового времени 4 под контролем всех показателей коагулограммы	2

<p>5. Какой препарат и в какой дозировке используют при обострении бронхиальной астмы при небулайзерной терапии? Выберите правильный ответ:</p> <p>1 грудной сбор №4 до 5 мл 2 сальбутамол в дозе 2,5 мг 3 амброксола гидрохлорид в дозе 30 мг 4 20% раствор n-ацетилцистеина 5 мл</p>	2
<p>6. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: К чему приводит антибиотикотерапия хронического абсцесса легкого?</p>	к ремиссии процесса
<p>7. На сколько увеличивает эффективность лечения (%) включение в эрадикационные схемы инфекции helicobacter pylori препаратов висмута? Выберите правильный ответ:</p> <p>1 7-8 2 40 3 3-5 4 15-20</p>	4
<p>8. Что относят к терапии первой линии для острой тромботической микроангиопатии? Выберите правильный ответ:</p> <p>1 антибактериальную терапию 2 глюкокортикоиды 3 свежезамороженную плазму 4 циклофосфамид</p>	3
<p>9. Что может быть осложнением пульс-терапии метипредом? Выберите правильный ответ:</p> <p>1 гипогликемия 2 понижение артериального давления 3 азотемия 4 иммунная депрессия</p>	4
<p>10. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: При каком виде пароксизмальной тахикардии наиболее эффективны вагусные пробы?</p>	узловой ав-тахикардии
<p>11. В какой стартовой дозе назначается илопрост взрослым пациентам (мкг на ингаляцию)? Выберите правильный ответ:</p> <p>1 5,5 2 3,5 3 2,5 4 4,5</p>	3
<p>12. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: При лечении какой желудочковой тахикардии нередко эффективно применение внутривенного введения сернокислой магнезии?</p>	пируэт
<p>13. Применение каких препаратов у больных с удлинённым интервалом q увеличить риск летального исхода? 14.</p>	2

<p>Выберите правильный ответ:</p> <p>1 бета-блокаторов 2 антиаритмических препаратов ia и ic классов 3 искусственного водителя ритма в сочетании с бета-блокаторами 4 симпатической денервации сердца в сочетании с бета-блокаторами</p>	
<p>15. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Сколько по времени проводится пероральная антикоагулянтная терапия пациентам после протезирования клапана механическим протезом?</p>	пожизненно
<p>16. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Что является противопоказанием к назначению статинов у женщин?</p>	беременность
<p>17. Какой препарат относят к антагонистам эндотелиновых рецепторов? Выберите правильный ответ:</p> <p>1 бозентан 2 силденафил 3 вазапростан 4 пентоксифиллин</p>	1
<p>18. Что характерно для цефалоспоринов v поколения? Выберите правильный ответ:</p> <p>1 анти - mrsa-активность 2 антисинегнойная активность 3 антианаэробная активность 4 лечение внутрибольничных пневмоний</p>	1
<p>19. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Что является наиболее важным для лечения больного ХОБЛ?</p>	обучение технике ингаляций и основам самоконтроля
<p>20. Что является эффективным методом оценки контроля бронхиальной астмы? Выберите правильный ответ:</p> <p>1 исследование спирометрии в динамике 2 контроль пульсоксиметрии 3 контроль эозинофилии в динамике 4 тест по контролю над астмой «аст»</p>	4
Терапия – 2 семестр	
<p>1. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Препарат выбора для лечения артериальной гипертензии при гестозе беременности?</p>	метилдопа
<p>2. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Сколько должна проводиться двойная антитромбическая терапия у пациента со стабильной стенокардией, выполненным плановым ЧКВ с наличием неклапанной фибрillation предсердий при низком риске кровотечения по шкале has-bleed?</p>	6-12 месяцев

<p>3. Какой препарат не рекомендуется назначать пациенту с сахарным диабетом 2 типа и стенокардией, принимающему органические нитраты?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <p>1 пиоглитазон 2 глибенкламид 3 метформин 4 лираглутид</p>	1
<p>4. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Кто наблюдает пациента больного саркоидозом после выписки из стационара?</p>	врач-терапевт участковый
<p>5. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Что относится к средствам, разжижающим мокроту путём разрушения сульфидных связей?</p>	ацетилцистеин, мукодин
<p>6. Что относят к ступенчатой терапии внебольничной пневмонии?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <p>1 этапное лечение (в стационаре и поликлинике) 2 применение физических упражнений с ходьбой по лестнице 3 двухэтапное применение антибактериальных препаратов: переход с парентерального на пероральный путь введения 4 галотерапию и массаж</p>	3
<p>7. Когда назначается антихолинергический препарат длительного действия тиотропий для лечения бронхиальной астмы?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <p>1 только в случаях сочетания с хобл 2 на i и ii стадиях терапии по gina 3 на iv и v стадиях терапии по gina 4 на всех стадиях терапии по gina</p>	3
<p>8. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой препарат является препаратом выбора при гнойной деструкции легких, вызванной кишечной палочкой?</p>	тиенам
<p>9. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Что относится к отрицательному эффекту искусственной вентиляции легких?</p>	уменьшение венозного возврата крови к сердцу
<p>10. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Сколько составляет суточная доза индакатерола (в мкг)?</p>	150-300

Производственная практика (клиническая) – 1, 2 семестры

<p>1. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: При лечении какой тахиаритмии катетерная абляция кавотрикусpidального перешейка является методом выбора?</p>	типового трепетания предсердий
<p>2. Что является показанием к транскатетерной имплантации аортального клапана?</p> <p>Выберите правильный ответ:</p> <p>1 коморбидная ибс 2 молодой возраст 3 высокий риск протезирования клапана</p>	3

4 женский пол	
3. Для какого заболевания характерны узелки гебердена? Выберите правильный ответ: 1 остеоартроза 2 ревматоидного артрита 3 реактивного артрита 4 подагрического артрита	1
4. При какой продолжительности кашля можно диагностировать хронический бронхит? Выберите правильный ответ: 1 1 месяца за последний год 2 3 месяцев на протяжении 2 лет 3 2 месяцев за последний год 4 1 месяца в год в течение 2 лет	2
5. Какие лабораторные показатели присущи остеоартрозу? Выберите правильный ответ: 1 тромбоцитопения 2 нормальные показатели крови 3 лейкоцитоз 4 лейкопения	2
6. Какие показатели обладают наибольшим значением для мониторинга состояния и оценки эффекта терапии при инфекции covid-19 при развитии острого респираторного дистресс-синдрома? Выберите правильный ответ: 1 лейкоцитоз, анемия 2 ил-6, д-димер 3 алт, аст 4 тропонин, nt pro-bnp	2
7. Какая схема рекомендована для применения таблетированных глюкокортикоидов? Выберите правильный ответ: 1 1/3 дозы утром + 2/3 после обеда 2 2/3 дозы утром + 1/3 после обеда 3 1 раз в день вся доза 4 3 раза в день в равных дозах	2
8. Какой препарат нельзя применять при лечении пневмонии у беременной? Выберите правильный ответ: 1 пенициллин 2 амоксицилав 3 доксициклин 4 эритромицин	3
9. Что является схемой первой линии эрадикационной терапии? Выберите правильный ответ: 1 ингибитор протонной помпы (в стандартной дозе 1 раз в сутки), кларитромицин (по 500 мг 1 раз в сутки) амоксициллин (по 1000 мг 1 раз в сутки) 2 ингибитор протонной помпы (в стандартной дозе 2 раза в	2

<p>сутки), кларитромицин (по 500 мг 2 раза в сутки) амоксициллин (по 1000 мг 2 раза в сутки)</p> <p>3 ингибитор протонной помпы (в стандартной дозе 1 раз в сутки), кларитромицин (по 500 мг 1 раз в сутки), висмута трикалия дицитрат (в дозе 240 мг 2 раза в сутки)</p> <p>4 ингибитор протонной помпы (в стандартной дозе 2 раза в сутки), кларитромицин (по 500 мг 2 раза в сутки), висмута трикалия дицитрат (в дозе 240 мг 2 раза в сутки)</p>	
<p>10. Прочтите вопрос и запишите развернутый ответ: Какой препарат применяют с целью компенсации внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы?</p>	<p>минимикросфера панкреатина</p>