

КОМПЕТЕНЦИЯ ОПК-10

ОПК-10 Способен участвовать в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства	З-ОПК-10 Знать: методы участия в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства У- ОПК-10 Уметь: участвовать в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства В- ОПК-10 Владеть: методами участия в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства
--	---

Перечень дисциплин	<u>Обязательные дисциплины:</u> Общие вопросы терапевтической патологии - 1 семестр Терапия – 3,4 семестры Производственная практика (клиническая) – 3, 4 семестры
--------------------	---

Вопросы	Ответы
Терапия – 3, 4 семестры	
1. Какой препарат предпочтительнее использовать для оказания неотложной помощи при гипертоническом кризе? Выберите правильный ответ: 1 нифедипин 2 нитроглицерин 3 налаксон 4 но-шпу	1
2. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какие неотложные мероприятия проводят при острой надпочечниковой	введение глюкокортикоидов и глюкозы
3. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой препарат считают самым эффективным для неотложной терапии при развитии анафилактического шока?	адреналин
4. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что включает в себя неотложная помощь при внутрижелудочковой блокаде, развившейся в результате введения новокаинамида?	введение атропина
5. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Самый эффективный и безопасный метод восстановления синусового ритма при аритмогенном шоке?	проведение кардиоверсии
6. Что является антидотом при отравлении метанолом? Выберите правильный ответ: 1 этанол 2 барбитураты 3 бензодиазепины 4 амфетамины	1
7. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: В чем заключается лечение олигурии при гиповолемическом шоке?	восполнение объема циркулирующей крови

8. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что является приоритетным способом неотложной помощи при клапанном пневмотораксе?	пункция плевральной полости
9. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что является приоритетным способом применения лс при астматическом статусе?	с помощью небулайзера
10. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какое положение придают пациенту при приступе бронхиальной астмы?	сидя с упором наклонившись вперед
11. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что является относительным противопоказанием к проведению тромболитической терапии?	обострение язвенной болезни
12. Что свидетельствует о правильности выполнения непрямого массажа сердца? Выберите правильный ответ: 1 видимое набухание шейных вен 2 наличие проводной пульсации на сонных артериях во время компрессии грудной клетки 3 наличие пульса на лучевой артерии 4 перелом ребер	2
13. Что необходимо сделать при первично зафиксированной фибрилляции желудочков или желудочковой тахикардии без пульса? Выберите правильный ответ: 1 ввести лидокаин 2 провести дефибрилляцию 3 ввести амиодарон 4 ввести атропин	2
14. С чего необходимо начинать оказание помощи при желудочковой тахикардии без пульса до готовности работы дефибрилятора? Выберите правильный ответ: 1 внутривенного введения адреналина 2 внутривенного введения наркотического анальгетика для обезболивания перед проведением дефибрилляции 3 обеспечения проходимости верхних дыхательных путей 4 непрямого массажа сердца	4
15. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Сколько секунд должна составлять пауза до и после нанесения разряда ручного дефибрилятора?	не более 10
16. До появления чего проводится промывание желудка? Выберите правильный ответ: 1 остатков пищи 2 чистых промывных вод 3 желчи 4 мутных промывных вод	2

17. Что относят к клиническим признакам обтурации верхних дыхательных путей Выберите правильный ответ: 1 осиплость голоса, кашель 2 звонкий голос, сухой кашель 3 сухой кашель со свистящими хрипами 4 цианоз, нарушение дыхания, отсутствие голоса, кашля	4
18. Сколько составляет начальная скорость инфузии 0,9% раствора хлорида натрия при анафилактическом шоке взрослому? Выберите правильный ответ: 1 20 мл/кг в первые 10-15 минут 2 10 мл/кг в первые 10-20 минут 3 10 мл/кг в первые 20 минут 4 5-10 мл/кг в первые 5-10 минут	4
19. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Как называется прием, применяемый для удаления инородного тела из дыхательных путей?	Геймлиха
20. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: В каком положении госпитализируют пациента при желудочно-кишечном кровотечении?	лёжа с приподнятым головным концом
Производственная практика (клиническая) – 3, 4 семестры	
1. Какое правильное соотношение компрессии и вентиляции при проведении комплекса СЛР у взрослого? Выберите правильный ответ: 1 30:2 2 15:2 3 5:1 4 5:2	1
2. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какие мероприятия неотложной помощи проводятся при анафилаксии с асфиксией и гипотонией?	обеспечение проходимости дыхательных путей
3. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что необходимо выполнить при декомпенсированном стенозе гортани?	трахеостомию
4. Для предотвращения чего выполняется прием Селлика? Выберите правильный ответ: 1 ларингоспазма 2 регургитации желудочного содержимого 3 рвоты 4 травмы голосовых складок	2
5. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой препарат является препаратом выбора для купирования пароксизма мерцательной тахикардии?	амиодарон
6. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что является показанием к проведению электрической кардиоверсии при пароксизмальных тахикардиях?	развитие острой сердечной недостаточности

7. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что необходимо для интубации трахеи?	ларингоскоп
8. Какой антидот вводится при отравлении опиатами? Выберите правильный ответ: 1 кордиамин 2 унитиол 3 налоксон 4 атропин	3
9. Какая доза фуросемида необходима при купировании отёка лёгких внутривенно? Выберите правильный ответ: 1 10 – 20 2 20 – 40 3 40 – 60 4 60 – 120	4
10. Какой препарат первой линии используют при терапии обострения бронхиальной астмы? Выберите правильный ответ: 1 фуросемид 2 эуфиллин 3 сальбутамол 4 морфин	3
11. Какой препарат является препаратом выбора при желудочковой тахикардии типа «пируэт»? Выберите правильный ответ: 1 сульфат магния 2 амиодарон 3 лидокаин 4 аспаркам	1
12. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что вводится внутривенно при рефрактерной фибрилляции желудочков?	амиодарона
13. Под контролем чего проводят внутривенное введение нитроглицерина при остром коронарном синдроме без подъема сегмента st? Выберите правильный ответ: 1 частоты дыхательных движений 2 частоты сердечных сокращений 3 насыщения крови кислородом 4 артериального давления	4
14. При лечении неосложненного гипертонического криза используется Выберите правильный ответ: 1 конкор, индап 2 гипотиазид, энам 3 амлодипин, лориста 4 каптоприл, моксонидин	4
15. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Какой препарат является препаратом выбора при асистолии во	эпинефрин

время сердечно-легочной реанимации?	
16. Что необходимо в лечении инфаркта миокарда осложненного застоем в малом круге кровообращения? Выберите правильный ответ: 1 краткосрочная внутривенная инфузия левосимендана на фоне гипотонии 2 применение ингибиторов апф при сопутствующей хронической почечной недостаточности и повышенного артериального давления 3 внутривенная инфузия кардиотонических лекарственных средств на фоне гиповолемии 4 внутривенная инфузия нитратов у больных без артериальной гипотонии	4
17. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что необходимо ввести внутривенно инфузионно больному в состоянии кардиогенного шока с выраженной артериальной гипотонией?	допамин
18. Применение каких препаратов необходимо избегать в лечении инфаркта миокарда правого желудочка? Выберите правильный ответ: 1 кардиотоников 2 кристаллоидов 3 нитратов 4 вазопрессоров	3
19. Назначение какого препарата является необходимым в остром периоде высоковероятной тромбоэмболии лёгочной артерии? Выберите правильный ответ: 1 морфина 2 гепарина 3 кардиомагния 4 эуфиллина	2
20. Прочитайте вопрос и запишите развернутый ответ: Что является признаком восстановления сердечной деятельности?	появление пульсации на сонных артериях